

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi. (" )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarih ve no.su 10.03.2004 / 4597

#### Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaç ile has.ara.Sür
Bağ*	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	75 gr/100 lt.su	14 gün
Domates	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	75 gr/100 lt.su	7 gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	100 gr/100 lt.su	7 gün
Hıyar	Beyaz çürüklük ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	75 gr/100 lt.su	7 gün
Kayısı	Çiçek monilyası ( <i>Monilia laxa</i> )	150 gr/100 lt.su	14 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	75 gr/100 lt. su	7 gün
Turunçgil	Kahverengi leke hastalığı ( <i>Alternaria alternata f.sp.citri</i> )	100 gr/100 lt.su	14 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Gerekli miktardaki ilaç, önce az bir su ile bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırıcı ve tank su ile tamamlanır. İyice karıştırılarak ilaçlamaya geçilir.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama rüzgarsız bir havada yapılmalı, bitkinin iyice ıslanmasına ancak ilacın akıtılmamasına dikkat edilmelidir. Bağda salkımların her tarafının iyice ilaçlanması gerekmektedir. Uzun süre tekrarlı ilaçlamalardan sonra hastalık etmenleri ilaca karşı direnç kazanabilir. Bunu önlemek için HERODION 50 WP ile iki uygulamadan sonra araya kontakt bir fungusit uygulaması yapılması önerilir.

#### KULLANMA DÖNEMLERİ:

**Bağda Kurşuni Küfe karşı;** üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce ilaçlamaya başlanmalıdır.

**Domateste Kurşuni Küfe karşı;** çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

**Domateste Erken Yaprak Yanıklığına karşı;** ilk lekeler görülünce başlanır.

**Hıyarda Beyaz Çürüklüğe karşı;** ilk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır.

**Kayısıda Monilya'ya karşı;**

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken)

2. ilaçlama tam çiçekte iken (%90-100 çiçekteyken) yapılır.

**Patlıcanda (Sera) kurşuni küfe karşı;** Sera da patlıcanda kurşuni küfe karşı hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

**Turunçgillerde kahverengi leke hastalığı:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

## HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HERODION® 50 WP

İslanabilir Toz  
% 50 Iprodione  
[3-(3.5 dichlorophenyl)-N-isopropyl  
2,4 dioxoimidazoline 1-carboxamide]

Grup	E3;2	Fungisit
------	------	----------

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ**  
**EVDE KULLANMAYINIZ**  
**ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ**  
**İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**  
**İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ**  
**SİGARA İÇMEYİNİZ**  
**DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ**  
**İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Aşırı dozda alındığında kaslarda gerilme, refleks azalması ve hareketlerde dengesizlik.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. İlaç teneffüs edilmiş ise hastayı temiz havaya çıkartınız. İlaça bulaşık elbiseleri çıkartınız. İlaç bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız.

#### Tedavi ve ANTİDOTU:

Özel bir antidodu yoktur; belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin ticari markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:  
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj  
no.su ile birlikte)

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı ; N:Çevre için Tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn :Zararlı

N :Çevre için Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

Iprodione

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu maske/gözlük kullanın

S57: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun kap kullanın.

14 Ocak 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** HERODİON 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E3;2 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HERODİON 50 WP' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E3;2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Bordo Bulamacı dışındaki Fungisitler, İnsektisitler ve Yaprak Gübrelere ile karıştırılarak kullanılabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce bir fiziksel karışabilirlik testi yapılması önerilir.

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**  
**HERODION® 50 WP**

Islanabilir Toz  
% 50 Iprodione  
[3-(3.5 dichlorophenyl)-N-isopropyl  
2,4 dioximidazoline 1-carboxamide]

Grup	E3;2	Fungisit
------	------	----------

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- İlaç ve artıklarını su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlacı kendi ambalajı içerisinde ağız kapalı olarak, rutubetsiz yerlerde saklayınız.
- Boş ilaç ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU :**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700.Sok.  
41480 Gebze/KOCAELİ  
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax : (0 262) 751 14 22

*Sm*

14 Ocak 2016  
GIDA TARİHİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

