

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. (")

Şarj No:

Ruhsat tarih ve no: 14.02.2012/8579

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	30 ml/100 lt.su	14 gün
	Yaprak biti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 lt.su	
Şeftali	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	10 ml/100 lt.su	14 gün
Antep fıstığı	Yaprak psillası (<i>Agonoscena targienii</i>)	20 ml/100 lt.su	14 gün
Kiraz	Yaprak büken (<i>Archips rosana</i>)	30 ml/100 lt.su	14 gün
Pamuk	Yaprak piresi (<i>Empoasca spp</i>)	20 ml/da	14 gün
Domates (Tarla-Sera)	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/da	3 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

Malinois kontak ve mide etkilidir. Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak alt yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pülverizatör ve bol su ile yapılacak iyi neticeler basınçlı pülverizatör veya atomizör kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak sureti ile elde edilir. Bunun içinde ince meme kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozun birim alana atılabilmesi için önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır. Bunun için kullanılacak ilaçlama aletiyle belli bir alana (en az 100 m2) sadece su pülverize edilerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Domates: Yaprak biti mücadelesinde bir yaprağa düşen zararlı sayısını belirlemek için tarlaya köşegenleri yönünden girilerek her 3-5 adımda bir tesadüfi olarak yaprak koparılır. Bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. MALİNOİS®

Akışkan sıvı

Litrede 240 gr Tau-fluvalinate

cyano(3-phenoxyphenyl)methyl N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valinate

Grup	3	Insektisit
------	---	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ
SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Mide bulantısı, merkezi sinir sisteminde felç, göz yaşarması, salya, burun akması, deride yanma ve kaşınma hissi.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Acil durumlarda hastayı derhal doktora götürün. İlaç etiketi ve ambalajını da birlikte götürün. Hastayı havadar bir yere al. İlaç bulaşmış elbiseleri çıkar, bulaşmış kısımları bol su ve sabunla iyice yıkayınız. Göze kaçmışsa göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice çalkala. Göz doktoruna götür. Yutulduğu takdirde kusturma. Hastanın şuuru yerinde değilse yan yatır, ağızdan bir şey verme.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

27 Ağustos 2015


İzzet BAYRAM
Daire Başkanı
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N : Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



N : Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Tau-fluvalinate

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
R50/53 : Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 : Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S24 : Cilt ile temasından sakının
S61 : Çevreye salınmasından kaçının.



REV.2

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Malinois adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Malinois'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekranması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik durumu: Alkali ilaçlar hariç Malinois bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. MALINOİS®

Akışkan sıvı

Litrede 240 gr Tau-fluvalinate

(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α , α , α -trifluoro-*p*-tolyl)-D-valinate

Grup	3	Insektisit
------	---	------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayın.
- İlaç ve zerrelere tatbikat esnasında boğazda tahriş yapabilir. Tatbikattan bir süre sonra bu belirtiler kaybolur.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- İlaç kapalı olarak serin ve kuru yerlerde, çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta muhafaza edin.
- Boş ilaç ambalajlarını başka maksatla kullanmayın. Usulüne uygun imha edin.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FİRMA ADI VE ADRESİ :

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsandede Cad. 700. Sokak

41480 Gebze/Kocaeli

Tel : (0262) 751 14 12

Fax : (0262) 751 14 22

TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Genel Müdürlüğü

KARAR EDİLMİŞTİR

Y. BAYRAM

Daire Başkanı

27 Ağustos 2015



REV.2