

İmal tarihi
Son kullanma tarihi:
Şarj no:
Ruhsat tarihi ve nosu:

9946

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 gr/100 lt.su	3 gün
Domates (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 gr/100 lt.su	3 gün
Çiçek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 gr/100 lt.su	3 gün
Kayısı	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100 gr/100 lt.su	7 gün
Kiraz	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	75 gr/100 lt.su	7 gün

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, kontakt, translaminar ve lokal sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Boscalid ve Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkili madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Domateste kurşuni küf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya domateste 2-3 çiçek salkımının oluştuğu dönemde, geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Domateste külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Biberde kurşuni küf: İlaçlamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile devam edilir.

Çiçek kurşuni küf: 1.ilaçlama: İlk çiçeklerin %10'u açınca, 2.ilaçlama: Çiçeklerin %50'si açınca, 3.ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kayısı ve Kirazda monilya: 1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önerilen dozda ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılıp yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Hektaş Metis®

Fungisit (Mantar ilacı)

WG (Suda dağılılabilen granül)

%6,7 Pyraclostrobin + %26,7 Boscalid

Pyraclostrobin: methyl N-[2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-

ylloxymethyl]phenyl](N-methoxy)carbamate

Boscalid: 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

Grup	C3,11	C2,7	Fungisit
	✓		

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS
ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY

YEMEYİNİZ.SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI
SAHAYA GİREMEZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Vücutta bulaşmışsa bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağzını temiz suyla yıkayın ve bolca su için. Hemen tıbbi yardım çağırın. Hastaya yağ süt veya alkol gibi emilmeyi artırıcı maddeler verilmemelidir. Hasta bayılmışsa temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağırılmalıdır. Göze bulaşması halinde 15 dakika süreyle suyla yıkayın, doktora gösterin

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ ŞEKLİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N:Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Pyraclostrobin
Boscalid

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. Mümkünse etiketini gösteriniz.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BARTAM
Daire Başkanı

30.1 Aralık 2014

Nuriye ARDIÇ
Kalite Kontrol Müdürü

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Hektaş Metis® adlı bitki koruma ürünü, "i mekanizmasına göre Grup C3,11 ve C2,7 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. i etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Hektaş Metis®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 ve C2,7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Sloop MZ, Süper Hektamethrin 100 EC ve Besentia gibi ilaçlarımızla karıştırılabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Hektaş Metis®

Fungisit (Mantar ilacı)

WG (Suda dağılılabilen granül)

%6,7 Pyraclostrobin + %26,7 Boscalid

Pyraclostrobin: methyl N-(2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ylloxymethyl]phenyl)(N-methoxy)carbamate

Boscalid: 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

Grup	C3,11	C2,7	Fungisit
	✓		

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsandede Cad. 700.Sok.

41480 Gebze/KOCAELİ

Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)

Fax : (0 262) 751 14 22

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Hayran
Dr. Yonca BAYRAM
Bölge Başkanı

01 Aralık 2014

Nuriye ARDIO
Kalite Kontrol Müdürü