

İMİAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 06/06/1997 ve 3179/97-106
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

| Bitki Adı | Hastalık Adı | Kullanma Dozu | Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün) |
|-----------------|---|------------------|--|
| Bağ | Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) | 150 g / 100 l su | 7 |
| | Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 125 g / 100 l su | |
| | Bağ Mildiyüsü (<i>Plasmopara viticola</i>) | 125 g / 100 l su | |
| Domates (Tarla) | Geç Yanıklık (Mildiyö) (<i>Phytophthora infestans Mont de Bary</i>) | 125 g / da | 7 |
| Şeftali | Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>) | 200 g / 100 l su | 7 |
| Hıyar (Sera) | Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200 g / 100 l su | 7 |
| Çilek (Sera) | Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 125 g / 100 l su | 7 |

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su depoya ilave edilir. Diğer ilaçlarla karışım yapılacak ise FOLPAN 80 WDG ayrı bir kapta eritilip yarımsa kadar su ile dolu ilaçlama aletinin deposuna ilk konulur. Aletin karıştırma düzeneği çalışırken karışımı istenilen diğer ilaç da ayrı bir kapta suda eritildikten sonra ilaçlama tankına ilave edilir, kalan kısım su ile tamamlanır, bu karışım bekletilmeden kullanılmaktadır. İlaçlama yapılırken bitkinin her tarafı ilaçlanarak iyi bir kaplama yapılmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Bağda Ölü Kol hastalığına karşı;

- Kış ilaçlaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan önce
- Yaz ilaçlaması: Birinci ilaçlama sürgünler 2-3 cm iken, ikinci ilaçlama, sürgünler 8-10 cm iken, üçüncü ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devreye yapılmalıdır.

İlaçlama tekniği: Gerek kış ilaçlamaları gerekse yaz ilaçlamaları havanın açık ve güneşli olduğu günlerde yapılmalıdır. İlaçlama yapılırken özellikle budama yerlerinin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaz ilaçlanmasında, yeni çıkan sürgünlerin tamamen ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.

Bağda Kurşuni Küf hastalığına karşı; İlaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcında başlanır. Sonraki ilaçlama ilacın etki süresi ve enfeksiyon yoğunluğu dikkate alınarak 10-12 gün sonra tekrarlanır.

Bağda Mildiyö hastalığına karşı; Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. Meteorolojik koşullar hastalığın enfeksiyonu için uygun devam ederse ve ilaçlamaların devamına gerek görülürse ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak 10- 14 gün aralıklarla ilaçlamalar yapılabilir. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

Domates (tarla) Mildiyüsü hastalığına karşı; Domates bitkisi 15 cm olunca veya ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. İlaçlama hasada kadar 7-10 gün ara ile kaplama şeklinde yapılır.

Şeftalide Yaprak Kıvrıklığı hastalığına karşı; Tomurcukların kabardığı dönemde ilaçlama yapılır.

Çilekte Kurşuni Küf hastalığına karşı; 1. ilaçlama serada ilk çiçeklerin %10'unun açtığı dönemde, 2.ilaçlama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde, 3.ilaçlama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

Hıyarda Mildiyö hastalığına karşı ; 1. ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır ve ilaçlamaya 10 gün ara ile devam edilir.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FOLPAN® 80 WDG

Suda Dağılılabilen Granül (WDG)
FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
% 80 FOLPET içerir.
N-(trichloro-methylthio)phthalimide

GRUP M4 FUNGİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözlerde kızarıklık, gözyaşı, deri, burun ve boğaz tahrişine neden olur. Tekrarlanan maruziyette kontakt dermatit olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde gereken şekilde eğitilmiş personel tarafından maruz kalmış kişiye oksijen verilebilir. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirlenen tüm giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Cildi sabun ve suyla iyice yıkayın. Ardından, ılık suyla durulayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Ağız bol su ile yıkayın. Doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Eğer ağrı devam ederse, bir göz doktoruna danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bitkinin özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulanır. Yutulduğunda, gastrik lavaj yapın ve aktif kömür uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (0312) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

28 Eylül 2015
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

Xn Zararlı



N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER | Folpet

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R20 Solunması halinde zararlıdır.
R36 Gözleri tahriş eder.
R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.



ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Çınarlı Mah. 5. Blok Kat: 5. Cad. No: 1
Marlı Tower B Blok Kat: 7 D: 703-704
Tel.: 0 312 462 61 40 Konak - İZMİR
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993