

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
SARI NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 13/01/2014 ve 9441

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	65 ml /100 L su	28 gün
Kavası	Cicek Moniliyası (<i>Monilinia laxa</i>)	50 ml / 100 L su	7 gün
Bag*	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Damates (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Kıraz	Cicek Moniliyası (<i>Monilinia laxa</i>)	50 ml/100 L su	7 gün
Patlican (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Şeftali	Cicek moniliyası (<i>Monilia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	50 ml/100 L su	21 gün
Biber (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye doza üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı
bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile
doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalarak durumdayken ilaçlı su depoya
ilever edilir. Karıştırma devam edilerek depo suya tamamlanır. İlaçlama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki
koruma ürününe aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı
ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün senin saatlerinde rüzgarlı veya az
rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin
deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan
sonra karıştırıcı ve pıskırtıcı sistemini karıştırarak tüm parçaların
yıkannmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında
yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

08 Temmuz 2020

TARIM VE ORGANİK DAKİNLİĞİ
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABULE EDİLMİŞTİR.

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

QUALY® 300 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP D1:9 FUNGİSIT (Mantar İlacı)

300 g/l Cyprodinil

NET MİKTARE:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

IÇİNDEKİLER Cyprodinil



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319 Ciddi göz tahririye yol açar.
H410 Suçul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 Cyprodinil, Propanoik asit, 2-hidroksi-2-etylheksil ester içeri.
Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukları erişmeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika
dikkatle durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/ kabi Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Atrialar zehirlidir, çiçeklenme zamamı kullanılmamız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulanırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun inme ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesintikle kullanılmamız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:**Elmada Karalekesi (*Venturia inaequalis*):**

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe rozet tomurecü döneninde (çiçekler ayrı ayrı görildiğinde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçeli monilyası (Kiraz, Kayısı, Şeftali) (*Monilia laxa*):

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-%10 çiçekte)

2.uygulama: Tam ciçeklenmede (%90-%100 çiçekte) yapılr.

Bağ Kurşunu Küf (*Botrytis cinerea*): Akdeniz, le Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde

1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında.

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Sen uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde:

1.Uygulama: Ciçeklenmeden hemen önce.

2.Uygulama: Kapalı salkım döneninde.

3. ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates (sera), Patlican (sera), Biber (sera) (*Botrytis cinerea*): Çevrede ilk hasatlı belirtilen périodlarında veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arıyla yapılmalıdır.**DİREÑ YÖNETİMİ:**

QUALY 300 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip

- bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direne gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direne gelişimini geciktirmek için QUALY 300 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 hariç) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünlerleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışma gerçek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

 **ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
QUALY® 300 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

300 g/l Cyprodinil**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kurut) şartlarda orijinal ambalajında asılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hiçbir (tolerası) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününü kullanımımız kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün taşıviye dışı, yanılı veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatası depolannması sonucu ortaya çıkabilecek zararlarından firma məsaliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tətbiq metodunun seqimindən, bitki koruma ürününün tasnimasi, depolannması, kullanım ve imha esnasında mühtemel risklerden sorumlu olur. Kullanımdan doğaçak tüm riskleri ortadan kardırmak mümkün deyildir. İlaçın spesifikasiyonuna uygunluğu, sadece ilaç testim sırasında firma garantisini altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TEŞİSİ:Adama Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Beer-Sheva 8410001 Israel**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Çinarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3/0806 Komk/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40

08 Temmuz 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARTELDİLEME

