

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (")
Şarj No: (Damga ile):
Ruhsat tarih ve no.su: 07.04.2011/8278

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Diamond[®]

Konsantre emülsiyon
Litrede 200 gr. Ethoprophos
(O-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate)

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar

Bitki Adı **Zararlı Adı** **Kullanma Dozu ve Dönemi**

Sebze Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 5 lt/da
Domatesin gelişme döneminde yeni bulaşmalar görüldüğünde

KULLANMA ŞEKLİ:

Önce damla sulama düzeninin çıkışları bitkilerin 10-15 cm uzağına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 5 dakika süreyle sulama yapılmalı., ardından sistemin deposuna su ile birlikte gerekli miktar ilaç konulmalı ve depodaki ilaçlı su tükenince sulama işlemine (normal olarak 15 dakika) devam edilmelidir.

Dikim öncesi **Diamond**[®] uygulandığında dikim zamanı, önceki nematod yoğunluğu, toprak yapısı, v.s.'ye bağlı olarak birkaç hafta sonra yeni bulaşmalar görülebilir. O nedenle köklerdeki yeni ur oluşumları sık sık gözlenmeli ve ilk yeni bulaşmalarla birlikte gecikmeden **Diamond**[®] uygulanmalıdır.

Diamond[®] unetki devamlılığı 3-4 haftadır. Mevsim nematod faaliyetine uygunsa 3-4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Diamond adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Diamond**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekranması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

Grup	1B	Nematosisit – insektisit
------	----	--------------------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLANMIŞ SAHAYA, SULANMIŞSA TARLA KURUYUNCA KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYIN.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seyirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaçla bulaşık giyecekleri çıkartın ve derinin bulaşmış kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayın. Göze temas halinde bol su ile 20 dakika süreyle yıkayın.

Eğer yutulmuşsa kusturmayı deneyin ancak soluk borusuna bir şey kaçmaması için önlem alın, ilacın etiketiyle hekime başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Antidotu: Atropin sülfat ve Toxogonin'dir.

Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanmalıdır.

© HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nin tescilli markasıdır.

06-03-2012

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T+ :Çok Toksik; N:Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T+ :Çok Toksik N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Ethoprophos

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R10: Alevlenebilir

R26/27: Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R38: Cildi tahriş eder.

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin.

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.

Mümkünse etiketini gösteriniz.

S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Diamond®

Konsantre emülsiyon
Litrede 200 gr. Ethoprophos
(O-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate)

Grup	1B	Nematosit – insektisit
------	----	------------------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan sonra kullanılan alet ve makineleri bol su ile yıkayın.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇISI:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700. Sokak
41480 Gebze/Kocaeli
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0262) 751 14 22



06-03-2012
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

