

# Sineb

İT, 750 q/kq Sineb

Tara yarlığı

İstifadədən əvvəl diqqətlə oxuyun!

**Təyinatı:** Fungisid kontakt-mühafizə təsirli olub tərəvəz və meyvə bitkilərində xəstəlik törədilicilərinə qarşı mübarizədə tətbiq olunur.

**Təhlükəliyi:** 2-ci sinif (təhlükəli birləşmə)

Arılar üçün orta təhlükəlidir (2-ci sinif təhlükəliyi)

**Qeydiyyatçı:** Aqriya AD Bolqaristan

Təsireddici maddə: 75% Sineb

**Konsentrasiyası:** 750 q/kq

**Preparativ forması:** İslanan toz

**Məhdudiyyət:** Çıləmə havanın temperaturu 15°C -dən aşağı olmayıaraq, küləyin sürəti 2-3 m/s olmaqla səhər və ya axşam saatlarında aparılır. Arılar üçün sərhəd mühafizə zonzsı 3-4 km- dən az olmamalıdır. Arının ucuş müddəti 48-72 saatdır. Preparatin çilənməsinə 4-5 gün qalmış yerli arı pətəyin sahibləri planlaşdırılmış çıləmənin xarakteri, hansı preparatın tətbiq olunması, dəqiqlik vaxtı və hansı zonada keçiriləcəyi barədə əvvəlcədən məlumat verilməlidir (radio və kütłəvi mətbuat vasitəsi ilə)

**Saxlanma müddəti:** 3 il

**Saxlanma temperaturu:** +4°C, +25°C- dək

**Yararlıdır:** 01.2021

**Prtiya:** № Az-0118

**İstehsal tarixi:** 01.2018

**Netto kütləsi:** 1 kq

**İstehsal və qablaşdırılması:** Aqriya AD, Bolqaristan  
şirkəti 4000 Ploudiv, Acenovqradske Şocce, 1

Bitki	Zərərli obyekt	Preparatin masarif norması kg/ha	İşçi möhülün masarif norması L/ha
Alma, Armud	Dəmgil (Venturia inaequalis), Dəmgil (Venturia pirina)	4	1000
Gavalı	Pas, polistihmox	3	1000
Şaftalı, albah, ərik, gilas	Klestosporioz, Kokomikoz, Monilioz, Deformasiya və s	3	1000
Üzüm	Mildium, Antraknoz	3	1000
Pomidor	Fitoftora (phytophthora infestan), Alternariya (Alternaria alternate), Septoria (Septoria lycopersici)	3-4	300
Xiyar	Peronosporioz, Antraknoz	4	300
Soğan	Peronosporioz	3	300
Kartof	Fitoftora (phytophthora infestan)	2,5	300
Kələm	Peronosporioz	3	300
Tütün	Peronosporioz	2,5	300
Gül	Pas, Unlu şəh	5	300

Satıcı: EMA MMC şirkəti  
Dövlət qeydiyyat nömrəsi:  
000101 12 noyabr 2008-cı il  
Təsireddici maddə: 75% Sineb