

İmal tarihi
Son kullanma tarihi:
Şarj no:
Ruhsat tarihi ve nosu: 9304/06.08.2013

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	30 ml/100 lt.su	28 gün
Biber (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 lt. su	3 gün
Domates (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 lt. su	3 gün

Hem değme (kontakt) hem de lokal sistemik etkili bir fungusittir. İki farklı etki şekline sahip etkin maddeler dolayısıyla direnç yönetimine uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ külleme:

- ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında;
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde;
- ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla tanelere ben düşme dönemine kadar devam edilir.

Biber ve Domates külleme (Sera): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrar edilir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önerilen dozda ilaç ayrı bir kaptan bir miktar suyla iyice karıştırılıp yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Article® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 11,C3 ve 7,C2 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Article®'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 11,C3 ve 7,C2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Sloop MZ, Croshe ve Süper Hektamethrin 100 EC ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Article®

Fungisit (Mantar ilacı)
Süspansiyon Konsantre (SC)

Litrede 100 gr Kresoxim methyl methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate + Litrede 200 gr Boscalid 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

Grup	11,C3	7,C2	Fungisit

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ
SİĞARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurun.

Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarınızı bol su ve sabun ile yıkayın. Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabılarınızı çıkarıp, tecrit edin. Ciltte küçük bulaşma olmuşsa diğer kısımlara bulaşmasını engelleyin.

Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Tıbbi yardım sağlayın ve ilaç ambalajını birlikte götürün.

Solunum: Temiz havaya çıkın. Solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

ULUĞAZI (Uludağ Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Dr. Ferudun KARAKAYA
Genel Müdür

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı; N:Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı N:Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Kresoxim methyl
Boscalid

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R50/53 : Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 20/21 : Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük kullanın.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun(mümkünse etiket gösterin)
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61:Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

09 Ekim 2014

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Ferudun KARAKAYA
Bitki Koruma
Pazarlama ve Geliştirme Müdürü

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Article®

Fungisit (Mantar ilacı)
Süspansiyon Konsantre (SC)

Litrede 100 gr Kresoxim methyl methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate + Litrede 200 gr Boscalid 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

Grup	11,C3	7,C2	Fungisit
------	-------	------	----------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlacı ambalajlarında kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

İLACI KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700.Sok.
41480 Gebze/KOCAELİ
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0 262) 751 14 22

M

09 Eylül 2014
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Ferudin KARAKAYA
Bitki Koruma
Pazarlama ve Geliştirme Müdürü