

İmal tarihi
Son kullanma tarihi:
Şarj no:
Ruhsat tarihi ve nosu: 27.11.2012/8918

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera)	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	500 ml/da	14 gün
Biber (Sera)	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium sp.</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	500 ml/da	10 gün
Hıyar (Sera)	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium sp.</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	500 ml/da	10 gün
Çilek (Sera)	Çilek kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Macrophomina phaseolina</i>)	500 ml/100 L su	3 gün
Tütün	Tütün fidelerinde çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Phythium spp.</i>)	15 ml/m ²	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Uygulama makinesi ya da süzgeçli kova yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ürün ilave edilir, daha sonra uygulama makinesinin deposu ya da süzgeçli kova kapasitesine kadar su ile tamamlanarak uygulamaya geçilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltılmamalıdır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Cebir®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	E2:12	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-------	------	-------------------------

12,5 g/L Fludioxonil + 5 g/L Metalaxyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR

ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri oluşturabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Özgür KOYUNCU
Bitki Koruma
Ürün Geliştirme Müdürü

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Fludioxonil
Metalaxyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kalan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
GEBİR®
Dr. Emine KURAN
Bitki Koruma
Ruhsatlandırma Yöneticisi

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
18 Mayıs 2017

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Domates, Hıyar, Biber) (Sera): Fideler seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile dekara tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir. Buna göre 1.uygulama fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır. Uygulamalara gerekirse 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Damlama sulama sistemi olmayan seralarda, bitki köklerine düşecek bitki koruma ürünü su miktarı; dekara doz, dekara bitki koruma ürünü uygulanacak bitki sayısı ve her bitki dibine verilecek su miktarı hesaplanarak verilir.

Çilek kök çürüklüğü: Çilek fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir. Buna göre 1.uygulama fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır. 2.uygulama birinci uygulamadan 15 gün sonra yapılır. Uygulamalara gerekirse 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Tütün fidelerinde çökerten: 1.uygulama fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. 2. uygulama 1.uygulamadan 14 gün sonra yapılır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında Cebir tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Cebir® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 12:E2 ve A1:4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cebir®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 12:E2 ve A1:4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Alkali karakterde olanlar hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılmasında sakınca yoktur.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**Cebir®**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	E2:12	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)

12,5 g/L Fludioxonil + 5 g/L Metalaxyl**DEPOLAMA DURUMU :**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsandede Cad. 700.Sok.

41480 Gebze/KOCAELİ

Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)

Fax : (0 262) 751 14 22

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL 18 Mayıs 2017

Özgür KOYUNCU
Bitki Koruma
Ürün Geliştirme Müdürü

Dr. Cemile KURAN
Bitki Koruma
Ruhsatlandırma Yöneticisi