

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 11/09/1996 ve 3001

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Kullanma Dozu	Kullanma Zamanı	Son İlaçlama İle Hasat Arasında ki süre (gün)
Pamuk	Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyaş 20-40 cm iken	90
Patates	Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan Ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde, Kanyaş 20-40 cm iken	28
Bağ*	Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	
Şeker Pancarı	Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken	
Kırmızı Mercimek	Yabani Yulaf (<i>Avenasterifis L.</i>) Kendi Gelen Buğday (<i>Triticum aestivum L.</i>) Kendi Gelen Arpa (<i>Hordeum vulgare L.</i>)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90
Soğan	Yabani Yulaf (<i>Avenaspp</i>) Kuşyemi (<i>Phalaris spp.</i>)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	
Ayçiçeği	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan Ot (<i>Setaria verticillata</i>)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyaş 25-40 cm iken.	56
Kanola	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpekdişi Ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kuşyemi (Phalaris spp.) Yabani Yulaf (Avena fatua) Tilki Kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i> Hu ds) Tavşan Bıyığı (Poaspp)	50 ml/da	Çıkış sonrası Yabancı otların kardeşlenme devresinde	56

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

KULLANMA ŞEKLİ: AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. AGİL EXTRA 100 EC dar yapraklı yabancıotların yapraklarından süzülerek alınır ve yabancıotların stolon ve rizom gibi toprakaltı aksamlarına taşınır. AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir ancak dar yapraklı yabancıotlar uygulamada çıkmış olmalıdır. AGİL EXTRA 100 EC ilaçlaması sırasında yabancı otların aktif büyüme devresinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. İlaçlamada iyi bir kaplama yapılması lazımdır ve uygun basınçta " 3 atmosfer " uygulama yapılmalıdır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygundur. Yer aletleri ile dekara 20-40 l su ile kullanılır. AgilExtra 100 EC ilaçlama aletine ve metal kısımlarına aşındırıcı etki yapmaz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini hemen bol su ile temizleyiniz.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AGİL® EXTRA 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
HERBİSİT (YABANCIOT İLACI)

100 g/l PROPAQUİZAFOP içerir.

2-isopropylideneamino-oxyethyl(R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yl)oxy]propinoate

GRUP | A | HERBİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ
DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU YORAKAK İYİCE
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA
BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. İlaçım yutulması halinde mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınır, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni solunum uygulayın. Doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Kirli giysileri ve ayakkabıları çıkarın, cildi hemen suyla yıkayın.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla en az 15 dakika yıkayın. Bir göz doktoruna başvurun.

Yutulması halinde: Ağız hemen bol suyla çalkalayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyicitedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

1 Kasım 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

Xi Tahriş edici

N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER	Propaquizafop Fattyalcoholpolyglycoether Çözücü nafta (petrol), ağır aromatik
-------------	---

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ
VE AÇIKLAMALARI:**

R36 Gözleri tahriş eder.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29/35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınma için uygun bir kap kullanın.

ADAMA TURKEY TARIM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çınarlı Mah. İslam Korimov Cad. No:1
Maru Tower A Blok, Kat:7 D:703-704
Konak - İzmit
Karşyaka V.D.: 007 0622 993

ETİKETİN DEVAMIDIR.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar temiz su konur. Tavsiye edilen dozdaki AgilExtra 100 EC ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır ve depoya ilave edilir. Karıştırıcı çalışırken deponun geri kalan yarısı temiz su ile doldurulur. Hazırlanan ilaçlı su bekletilmeden kullanılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: AgilExtra 100 EC tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkilerine olumsuz bir etki yapmaz. AgilExtra 100 EC bileşiminde zaten bulunduğu için uygulamada 'ayrıca bir yayıcı yapıştırıcı' madde kullanma gereği yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

AgilExtra 100 EC muhtelif fungusit ve insektisitlerle karışım halinde kullanılabilir. Ancak geniş yapraklı yabancı ot öldürücü bazı ilaçlarla tank karışımı halinde kullanıldığında hem etkide ve hem de kültür bitkisinin tahammülünde bir kısım azalma olabileceğinden, bu konuda öncedenyerde bir karışabilirlik testi yapmadan bu gibi ilaçlarla tank karışımı halinde kullanılması tavsiye edilmez. Şayet böyle bir test yapılmamış ise AgilExtra 100 EC ile diğer herbisit uygulamaları arasında 3 gün süre bırakılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AGİL EXTRA 100 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AGİL EXTRA 100 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AGİL® EXTRA 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
HERBİSİT (YABANCIOT İLACI)

100 g/l PROPAQUİZAFOP içerir.

2-isopropylideneamino-oxyethyl(R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propinoate

GRUP | A | HERBİSİT

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boşambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. 35 °C'nin üzerinde depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

FİRMASI:

Adama Quena N.V.
Pos Cabai Office Park Unit 13,
P.O. Box 403 Curacao


FABRİKA ADRESİ:

Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40

ADAMA TURKEY TARIM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. No:1
Martı Tower A Blok Kat:7 D:703-704
Konak - İZMİR
Kayıtlı No: 007 0622 993



Kasım BAYRAM
Daire Başkanı