

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi.  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve Numarası: 06.09.2016 / 10752



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

# HEKTAŞ AKTOR®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantarilacı)
------	------	------------------------

500 g/L Imazalil

## KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates	Sebzelerde kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	30 ml /100 L su	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	30 ml /100 L su	
Turunçgiller	Mavi küf çürüklüğü ( <i>Penicillium italicum</i> )	400 ml/100 L sulu mum	3 gün
Patlıcan (Sera)	Sebzelerde kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	30 ml /100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Sebzelerde kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	30 ml /100 L su	3 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Sebzelerde kurşuni küf [Domates, Patlıcan (Sera), Biber (Sera)]:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün aralyla yapılmalıdır.

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bazen titreme, baş dönmesi, kaşıntı, deri kızarıklığı ve ishale sebep olmaktadır. Yüksek dozlarda iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma görülmektedir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz:** Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

**Yutma:** Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

**Solunum:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulayın. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Ağız yoluyla alınması halinde gastrik lavaj uygulayın ve aktif kömür verin.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 112

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

### İÇİNDEKİLER:

Imazalil

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

05 Nisan 2022  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIRARCAN  
Başkan

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
M. KÖYÜNCÜ  
Koruma Grup Müdürü



**Domates erken yaprak yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

**Turuncgillerde mavi küf çürüklüğü:**

İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar sulu mum ile doldurulur sonra hesaplanan miktar yarıya kadar doldurulan depoya yavaş yavaş dökülür. Gerekli miktar sulu mum aletin deposuna ilave edilerek hazırlanan solüsyon bitinceye kadar karıştırmaya devam edilir.

Hasat sonrası turuncgillerde watervax ile kullanma dozu: bir varil watervax'a (200 litre) 800 ml Hektaş Aktor® karıştırılarak kullanılır. Karışım 24 saat içerisinde kullanılıp bitirilmelidir. Mevcut karışım 1,3 ml/1 kg meyveye isabet edecek şekilde pülverize edilmelidir. Pülverize edildikten sonra meyveler tam kurutulmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Hektaş Aktor®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Hektaş Aktor®** 'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU :**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

**HEKTAŞ AKTOR®**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

500 g/L İmazalil

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.


**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0262 751 14 12  
Fax: 0262 751 14 22



05 Nisan 2022  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

