

İstehsalçı Firma

Webba Kimya A.Ş.
AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cad. No:29
Döşemealtı/ANTALYA/TÜRKİYE
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88
www.webbakimya.com
info@webbakimya.com

weBba

SL

AMINO MOVE

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları

TƏYİNAT SAHƏSİ	İSTİFADƏ MIQDARI		İSTİFADƏ ZAMANI
	Dəmcili suvarma vasitəsilə l/ha	Yarpaq vasitəsilə ml/100 L su	
POMİDOR, BİBƏR, BADİMCAN, XİYAR, QOYUN, QARPIZ, QABAQ, LOBNA, NOKUD, MƏRCİMAK	2-3 L	250 ml	İlk dəfə bitki cücərdə və ya ştillar akıldikdən 10-15 gün sonra tətbiq olunur, məhsul yığımın sonuna qədər davam etdirilir.
ÇİYƏLƏK	2-3 L	250 ml	İlk dəfə ştillərin akımından 10-15 gün sonra tətbiq olunur və ikinci tətbiq çiçəkləmə dövrünün başladığı andan tövsiyə edilir.
BAĞ, KİVİ	2-3 L	250 ml	Kökərdən yeni fidanların cücərməyə başladığı bahar fəslindən etibarən məhsul yığımına qədər tətbiq olunur. Məhsul yığımından sonra isə 15 günlük fasilələrlə 2 dəfə tətbiq olunması tövsiyə edilir.
BANAN	2.5-3 L	250 ml	Yarpaq və ya dəmcili suvarma vasitəsilə (30 günlük fasilə ilə) tətbiq oluna və ya digər pestisitlərlə qarşılıqlı tətbiq oluna bilər.
SİTRUS BİTKİLƏRİ, GİLƏS, ŞAFTALI, ƏRIK, ALÇA/ GAVALI	2.5-3 L	250 ml	Kökərdən yeni fidanların cücərməyə başladığı yaz fəslində ilk tətbiq həyata keçirmək, inkişaf dövrü ərzində isə tətbiq davam etmək tövsiyə edilir.
ALMA, ARMUD, HEYVA, ZEYTUN, FİNDIQ, QOZ, PÜSTƏ	2-3 L	250 ml	Kökərdən yeni fidanların cücərməyə başladığı yaz fəslində ilk tətbiq həyata keçirmək, inkişaf dövrü ərzində isə tətbiq davam etmək tövsiyə edilir.
ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU	2.5-3 L	250 ml	Əkildikdən sonra, cücərmədən əvvəl yabəm əlaq etməmə qarşı tətbiq olunan pestisitlərlə birgə istifadə oluna bilər.
QARĞIDALI, GÜNƏBAXAN	2.5-3 L	250 ml	İlk dəfə cücərməyə başladığı 10-15 gün sonra tətbiq olunur, məhsul yığımın sonuna qədər davam etdirilir.
KARTOF, YERKÖKÜ, SOĞAN, SARIMSAQ	2.5-3 L	250 ml	Əkildikdən və ya ilk cücərməyə başladığı andan etibarən 15 günlük fasilələrlə 4 dəfə tətbiq olunmalıdır.
BUDƏ, ARPA, ÇİLTİK	-	250 ml	Kullanılan dövürdən əvvəl və erkən çiçəkləmə dövründə yarpaqdan tətbiq olunması tövsiyə edilir.
PAMBİQ	2.5-3 L	250 ml	Yarpaq vasitəsilə: Bitkilər 3-5 yarpaqlı olduqda zaman və erkən çiçəkləmə dövründə tətbiq olunur. Dəmcili suvarma vasitəsilə: Təminatq sahə şumlanarkən hazırlanır.

Bitki Tərkibli Amin Turşusu Olan Mayə Üzvi Gübrə



Zəmanətli Məzmun (%w/w)

Üzvi Maddə	30
Üzvi Karbon	9
Üzvi Azot	4
Sərbəst Amin Turşuları	9
pH	5-7



Xalis çəki: 1 L / 1.1 Kq



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
EMA QSC

Sabunçu qəsəbəsi, şəhər şossesi
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Tel: (+994 12) 450 34 17
info@emaagro.com
www.emaagro.com

İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Xalis çəki: 1 L / 1.1 Kq

Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında sərın və quru şəraitdə (minimum +5°C -dən + 45°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan bərbəşə günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq hüdudlarından kənarə dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşıyır.

XƏBƏRDARLIQLAR:
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.
UŞAQLARDAN və QIDALARDAN UZAQ TUTUN.
DƏRİ VƏ GÖZ TƏMAS ETDİRMƏYİN
YALNIZ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.
HEÇ BİR HALDA UYGUN GÖRÜLEN MIQDARDAN ARTIQ TƏTBIQ ETMƏYİN.
TOPRAQ VƏ YA YARPAQ ANALIZI EDİLDİKDƏN SONRA
GÜBRƏNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ TƏVSIYƏ OLUNUR.

