

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 18/04/2014 ve 9637

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi
Şekerpancarı	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	1. Uygulama 100 ml/da Çıkış sonrası Şekerpancarı tam kotiledon aşamasında Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde başlanır.
	Yabani Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	2. Uygulama 100 ml/da İlk ilaçlamadan 7-10 gün sonra yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.
	Dikenli yabani marul ( <i>Lactuca serriola</i> )	3. Uygulama 100 ml/da İkinci ilaçlamadan 7-10 gün sonra, Yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.
	Şürüncü Horoziböğü ( <i>Amaranthus blitoides</i> )	
	Kırmızı Kökllü Tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

28 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Umüt Uğur BAHÇE  
Daire Başkanı



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# BELVEDERE FORTE®

Süspo-Emülsiyon (SE)

GRUP N ve C1 Herbisit (Yabancıot İlacı)

200 g/l Ethofumesate,

100 g/l Phenmedipham ve 100 g/l Desmedipham

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EYDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**ÇİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham
-------------	---



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
EUH208 1,2-Benzosothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ**

- P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.
- P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
- P501 İçindekileri / kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

ADAMA TURKEY  
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.  
No:3 Sunucu Plaza B Blok K:8 D:806/807  
808/809/810 Konak - İZMİR  
Tel : 0 232 462 61 40  
Karsiyaka V.D. : 007 0428 999

Ali TETİK  
Zir. Yük. Müh.



**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

BELVEDERE FORTE bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kullanılır. 1. uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri BELVEDERE FORTE'ye çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken BKÜ karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda BKÜ kullanımı durumu daha da kötüleştirir için stres altındaki şekerpancarına BKÜ kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse uygulama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

BELVEDERE FORTE isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C1 ve Grup N olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için BELVEDERE FORTE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici ve Grup N harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

BELVEDERE FORTE® diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan kullanılmalıdır. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**BELVEDERE FORTE®**

Süspo-Emülsiyon (SE)

GRUP	N ve C1	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	---------	----------------------------

200 g/l Ethofumesate,

100 g/l Phenmedipham ve 100 g/l Desmedipham

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

**ÜRETİCİ FİRMA:**

Adama Agan Ltd.  
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,  
Ashdod, 7710201 İsrail

**ÜRETİM YERİ:**

Adama Agan Ltd.  
P.O. Box 262,  
Ashdod, 7710201 İsrail

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti  
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.  
No:3/0806 Konak/İZMİR  
Tel: 0 232 462 61 40  
Tel: 0232 462 61 40



ADAMA TURKEY  
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.  
No:3/0806 Konak - İZMİR  
Tel : 0 232 462 61 40  
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993

Ali TETİK  
Zir. Yük. Müh.

28 Şubat 2019

YARIN VE ORMAN BAKANLIĞI  
ZARARLI KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

