

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. ( " )

Şarj No: (Damga ile) Tarım ve Köyşleri Bakanlığı'nın tarih ve Ruhsat tarih ve no.su ve sayılı Zirai Mücadele ilacı Ruhsatını haizdir

# Doruk Ultra

Defoliant (Yaprak Dökücü)  
SC (Süspansiyon Konsantre)  
Litrede 119.75 gr Thidiazuron+59.88 gr Diuron  
N-phenyl-N'-1,2,3-thidiazol-5yl-urea +  
N'(3,4-dichlorophenyl)-N',N-dimethylurea  
LD<sub>50</sub> :3000 mg/kg

## KULLANIM ALANI

Bitki	Doz/dekar	Uygulama Zamanı	Hasat Aralığı
Pamuk	60 ml	Pamuk hasadından 10-14 gün önce	

**Doruk Ultra**, pamuk hasadından 10-14 gün önce uygulanan ve yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir defolianttır. Yapraklar tarafından alınır ve sapın gövdeye bağlandığı yerdeki ayrıcı dokunun erken olgunlaşmasını sağlayarak yapraklar henüz yeşilken dökülmelerine neden olur. Yapraklar kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlar.

### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalışır vaziyette iken yavaş yavaş ilave edilir. Deponun geri kalan kısmı su ile tamamlanır.

### KALİBRASYON:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konular ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Dekara 40 lt su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İyi sonuç alabilmek için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlül ile teması esastır.

### KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta hasattan 10-14 gün önce uygulanır. Dekara 40 lt su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlül ile teması sağlanmalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

### Kullanma Uyarıları:

İlaç Pamuktan başka kültür bitkilerinde kesinlikle kullanılmamalıdır. 24 saat içinde yağış olması halinde ilaçlamayı tekrarlayınız. Daha önce Sodyum chlorat, Magnezyum chlorat veya Diquat kullanılmış tarlalara kesinlikle Doruk Ultra uygulamayınız.

### Ürün Münavebesi:

Doruk Ultra kullanılan pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama:

Havuç	3 ay ekmeyiniz
Baklagil, Yonca, Kökü ve yaprağı yenen sebzeler	2 ay ekmeyiniz
Hububat,Darı, Mısır	2 hafta ekmeyiniz
Soğan	4 ay ekmeyiniz
Marul	9 ay ekmeyiniz

### KARIŞİBİLİRLİK DURUMU:

İlaç pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek duymamaktadır.

**DİKKAT**

### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

### EVDE KULLANMAYINIZ

### ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

### İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

### MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

### İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ

### SİGARA İÇMEYİNİZ

### DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

### İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Zehirlenme belirtileri Sedation ve Cyanosis'tir.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız. İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız ve vücuda değdiği kısımları bol sabunlu su ile yıkayınız. Göze bulaşması halinde en az 15 dakika temiz su ile yıkayınız. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız. Bol miktarda süt, yumurta beyazı veya su içiriniz. Gerekli görülmesi halinde sun'i teneffüs yaptırınız. İlerleyen zehirlenme belirtileri görülmesi halinde derhal doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

### ANTİDÖTÜ ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır. Cyanosis durumunda C vitamini ve oksijen veriniz. Hastayı güneş ışığından koruyunuz.

**Kontraindikasyonu:** Alkol verilmemelidir.

**UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114**

18 Nisan 2007

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:  
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj  
no.su ile birlikte)

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bal arılarına tehlikeli değildir.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.İlacın rüzgarla veya akan sular vasıtası ile komşu kültür bitkilerine bulaşmasını engelleyiniz.
- Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız veya bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.
- İlaçlı mahlülün aletin içinde kurumasına engel olmak için uygulamadan hemen sonra tüm aleti ve parçalarını sabunlu ve sodalı su ile iyice yıkayınız. Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- İlacı orijinal ambalajında ağız kapalı olarak, yiyecek ve içeceklerden uzak, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun biçimde imha ediniz.
- İlacı kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

### DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olarak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### İmalatçısı:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700. Sokak  
41480 Gebze/Kocaeli  
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax : (0262) 751 14 22

Dr. Ahmet KİŞMİR  
Pazarlama ve Geliştirme Md.  
İrem ÇAĞIN  
Pazarlama ve Geliştirme  
Müdür Yrd.  
HEKTAŞ//REV.0

