

İstehsalçı Firma

Webba Kimya A.Ş.
AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cad. No:29
Döşemealtı/ANTALYA/TÜRKİYE
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88
www.webbakimya.com
info@webbakimya.com



SL

İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilib.
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilib.
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilib.

Xalis çəki: 1 L /1.30 Kq

EXPRESS K

Kalium Məhlulu

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları

İSTİFADƏ EDİLƏCƏK BİTKİ	İSTİFADƏ MIQDARLARI		İSTİFADƏ ZAMANI
	Damcılama Və Ya Çiləmə	Yarpaqlardan Püskürtmə	
İSTİXANA BİTKİLƏRİ	10-15 L / 1 ton su/gün/ha	200-250 ml / 100 L su	Böyümə dövrünün başlanğıcından tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
ÇÜĞÜNDÜR	10 L/ha	200-250 ml / 100 L su	Böyümə dövrünün başlanğıcından tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
PAMBIQ, SƏNAYE BİTKİLƏRİ		200-250 ml / 100 L su	Böyümə dövrünün başlanğıcından tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
AÇIQ TARLA BİTKİLƏRİ	5 L/ha	200-250 ml / 100 L su	Böyümə dövrünün başlanğıcından tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
MEYVƏ AĞAÇLARI	Ağacın yaşına görə: 50-200 ml /hər ağaca	200-250 ml / 100 L su	Zoğların başlanğıcından etibarən tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
TAXILLAR	-	200-250 ml / 100 L su	Zoğ buraxma və kök atma zamanı bir tətbiq məsləhət görülür.
BAG	2 L/ha	200-250 ml / 100 L su	Çiçəkləmə başlanğıcından tətbiq olunur. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
ZEYTUN	Ağacın yaşına görə: 50-200 ml /hər ağaca	200-250 ml / 100 L su	Çiçəkləmə başlanğıcından tətbiq olunur. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
SİTRUS MEYVƏLƏRİ, ÇAY, BANAN	Ağacın yaşına görə: 50-200 ml /hər ağaca	200-250 ml / 100 L su	Zoğların başlanğıcından etibarən tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.
BƏZƏK BİTKİLƏRİ		200-250 ml / 100 L su	Böyümə dövrünün başlanğıcından tətbiq edilir. 15 gün ara ilə 2-3 tətbiqin təkrarlanması məsləhət görülür.

Torpaq Tətbiqi: Tərəvəz, meyvə ağacları və açıq tarla tərəvəzləri üçün 10-20 L/ha tətbiq miqdarı tövsiyə olunur.

Qarışdırma: Qələvi məhsullar, yağ, kükürd, mis və mis məhsulları ilə qarışdırmayın. Bütün qarışıqlardan əvvəl, əvvəlcədən sınaqdan keçirdiyinizə əmin olun.



Zəmanətli Məzmun

Suda həll olunan kalium oksidi (K₂O)
pH

(%w/w)

30

3-5



Xalis çəki: 1 L /1.30 Kq

Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında sərın və quru şəraitdə (minimum +5°C -dən + 45°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq həddularından kənarında dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

XƏBƏRDARLIQLAR:
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.
UŞAQLARDAN VƏ QIDALARDAN UZAQ TUTUN.
DƏRİ VƏ GÖZÜ TƏMAS ETDİRMƏYİN
YALNIZ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.
HEÇ BİR HALDA UYGUN GÖRÜLƏN MIQDARDAN ARTIĞ TƏTBİQ ETMƏYİN.
TOPRAQ VƏYA YAPRAĞ ANALİZİ EDİLDİKDƏN SONRA
GÜBRƏNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ TÖVSIYƏ OLUNUR.



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
EMA QSC

Sabuñcu qəsəbəsi, şəhər şossesi
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Tel: (+994 12) 450 34 17
info@emaagro.com
www.emaagro.com