

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 11.12.2017/10999

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (gün)
Şekerpancarı	Kırmızı Köklü Tıllı Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Çıkış öncesi 400 ml/da	90
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	Çıkış sonrası 400 ml/da	90
	Yalancı Kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>)		
	Şeytan Elması (<i>Datura stramonium</i>)		

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Daha önce kullanılmış olan ilaç artıkları ilaçlama aletinden iyice temizlenir. İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su depoya ilave edilir. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Kısa iş molaları ardından ilaçlamaya devam edilir. Yabancı otlar, ilaç ile muntazam kaplandığı takdirde ot kontrolünde iyi bir başarı elde edilir. Dekara kullanılacak su 20-40 lt olmalı, yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GOLTIX® 700 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP C1 HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

700 g/l METAMİTRON

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Mide bulantısı, kusma, ishal gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bolca su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

CİLTLE TEMAS: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.



NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	Metamitron
-------------	------------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 5-kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on ve 2-metil-4-izotiyazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P501 İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Geniş Mah. 1. Kat Kat:1
Meriç İyid. Mah. Kat:1 D:703-704
Tel: 0 312 462 41 40
Konya - Türkiye
Ziraat Yüksek Mühendisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri GOLTIX 700 SC'a çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Şeker pancarı stres altında iken herbisitlere karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlar, büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki aşırı yüksek ve aşırı düşük ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararları gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştirir için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Kullanım Şartı:

Yüksek kireç içerikli, tuzluluk oranı yüksek ve sürüm yapılmamış veya kireç tabanlı topraklarda GOLTIX® 700 SC uygulamalarından kaçınınız.

Yabancı Otların Çıkış Öncesi Uygulanması:

GOLTIX® 700 SC uygulaması toprağın nemli, düzgün sürülmüş kesek ve aşırı bitki kalıntısı olmayan ve yabancı otların çıkışının başlamadığı yerlerde yapılmalıdır. Uygulama ekim sonrası yapılmalıdır. Atım aleti karıştırıcı, orta ve yüksek basınçlı flat fan atım ucun olan ve hedef alana yeknesak uygulama yapabilecek seviyede olmalıdır. Çıkış öncesinde önerilen su miktarı dönüme 20-40 lt'dir. Yabancı otların çimlenmesinden önce uygulama yapılan alanda 5 gün içerisinde en az 10 mm yağmur düşmesi veya yağmurlama sulama sistemi ile sulanması ilacın toprakta daha iyi çözünmesi açısından önem arz eder. Gerekli olduğu durumlarda yabancı otların çıkışı öncesi tatbik edilen GOLTIX® 700 SC'den sonra tekrar çıkış sonrası uygulamalar gerekebilir.

Yabancı Otların Çıkış Sonrası Uygulanması:

GOLTIX® 700 SC; yabancı otların 2-6 yaprak döneminde çıkışı sonrası kullanılır. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişimi devam etmeli ve herhangi bir stres koşulu altında olmaması gerekir. Atım aleti karıştırıcı, orta ve yüksek basınçlı flat fan atım ucu olan ve hedef alana yeknesak uygulama yapabilecek seviyede olmalıdır. Önerilen su miktarı dönüme 20 lt'dir. Uygulama sırasında şeker pancarı bitkisi stres koşulları altında gelişmemesi ve en az 2 gerçek yaprak döneminde olması gerekmektedir. Yabancı otların çıkışı devam ettiği durumlarda GOLTIX® 700 SC tekrar uygulanması gerekebilir. GOLTIX® 700 SC, mineral yağ bazlı bir yapıcı yapıştırıcı ile kullanılabilir.

GOLTIX® 700 SC, şeker pancarında tek yıllık yabancıotların kontrolü için hem kök hem de yaprak yoluyla alınabilen, kontak ve sistemik özelliklere sahip, çok yönlü, güvenli seçici bir herbisittir. GOLTIX® 700 SC yabancıotların çıkışı öncesi ve sonrası kullanılan bir herbisittir.

Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

EKİM-DİKİM MÜNAVEBESİ:

GOLTIX® 700 SC uygulamasından şeker pancarı hariçinde ancak 16 hafta sonra ekim-dikim işlemleri yapılabilir. Bu 16 haftalık periyodun sonunda derin sürüm yapılarak ekim dikim yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

GOLTIX 700 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için GOLTIX 700 SC'ın aynı üretim sezonu içerisinde toplam 3 uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

GOLTIX 700 SC gübrelere ya da başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmak istenirse ön karışım denemesi önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GOLTIX® 700 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C1	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	----	----------------------------

700 g/l METAMİTRON

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

ÜRETİCİSİ:

Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
İslam Kerimov Caddesi/No:1 Mart Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40

2017
Aralık 2017
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. İslam Kerimov Caddesi No:1
Mart Tower Kat:7 D:703 Konak - İZMİR
Tel: 0232 462 61 40
Konya 45100
GİZEM UYSAL
Ziraat Yüksek Mühendisi