

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 25.06.2014 ve 9718

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Kırmızı köldü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	700 ml/da	Çıkarı sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)		
	Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)		
	Dönbaba (<i>Erodium cicutarium</i>)		
	Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>)		
	Kırmızı çiçekli balbaba (<i>Lamium purpureum</i>)		
	İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)		
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)		
	Kamış (<i>Phragmites australis</i>)		
	Ortanca sinir otu (<i>Plantago media</i>)		
	Kıvrıkcık labada (<i>Rumex crispus</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)		
Isrganotu (<i>Urtica wrens</i>)			
Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	450 ml/da	Çıkarı sonrası, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır
	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>)		
	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>)		
	Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)		
	Yatik boya kökü (<i>Asperugo procumbens</i>)		
	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)		
	Koyungözü papatya (<i>Bellis perennis</i>)		
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)		
	Japon bromu (<i>Bromus japonicus</i>)		
	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)		
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>)		
	Saka dikenli (<i>Carduus pycnocephalus</i>)		
	Topak boynuz otu (<i>Cerastium glomeratum</i>)		
Yabani havuş (<i>Daucus carota</i>)			
Hazaran (<i>Delphinium consolida</i>)			
Güneş sütleğeni (<i>Euphorbia helioscopia</i>)			
Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)			
Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>)			
Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>)			
Ballibaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)			
Tavşan salatası (<i>Lapsana communis</i>)			
Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>)			
Adi salkım otu (<i>Poa trivialis</i>)			
Düğün çiçeği (<i>Ranunculus repens</i>)			
Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)			
Yatik imam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>)			
Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)			
Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)			
Kaba tüylü fiğ (<i>Vicia hirsuta</i>)			
Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)			
Doğu ballibaba (<i>Wiedemannia orientalis</i>)			



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LEGATO® LENNS

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP G ve F1 HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

250 g/l Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l Diflufenican

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Glyphosate, Diflufenican (ISO), Isopropilamin tuz
-------------	---



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P501 İçindekileri / kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH208 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti deposunu iyice yıkayıp temizleyiniz.

Ali TETİK

Ruhsatlandırma Müdürü

Ali Tetik

ADAMA TURKEY

TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Çınarlı Mah. Şehir Polis Fethi Sokun Cad.

No:3 Sancu Plaza B Blok K. 8 D: 806/807

808/809/810 Konya - İZMİR

Tel : 0 232 462 6140

Korşuoka YD. : 007 8622 993



23 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR





ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

LEGATO® LENNS

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP G VE F1 HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

250 g/l Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l Diflufenican

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın, Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Yutma: Ağız bol su ile çalkalayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Ciltle temas: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayın. Semptomlar devam ederse doktora başvurun. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayın.

Gözlerle temas: Önlem ifadelerine bakın, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Belirli bir antidotu bilinmemektedir. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA, ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agan Ltd.

Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/0806
Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 6140

Bağ*	Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilkıkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	400 ml/da	Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır
Turunçgiller	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sürüncü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colomum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	400 ml/da	Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır
Zeytin	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilkıkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	400 ml/da	Çıkış sonrası uygulanır
Elma	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilkıkuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Adi fig (<i>Vicia sativa</i>)	400 ml/da	Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde, çıkış sonrası olarak uygulanır
	Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Cobanedeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Ballıbaba (<i>Laminum purpureum</i>) Ebegü meci (<i>Malva sylvestris</i>) Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>) Labada (<i>Rumex sp.</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Üçgül (<i>Trifolium sp.</i>) Yatik sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Patrak (<i>Xanthium strumarium</i>) Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Duvar kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	500 ml/da	Yabancı otların 2-10 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde, çıkış sonrası olarak uygulanır

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

23 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.



Ali TETİK
Ruhsatlandırma Müdürü
ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No: 3 Sanayi Plaza B Blok K. 8 D. 806/807
808/809/810 Konak - İZMİR
Tel : 0 232 462 6140
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde kullanılır. Geç dönemde yapılacak uygulamalar hem ani etkiyi azaltır hem de kalıcı etkiyi olumsuz yönde etkiler. Legato Lenns su ile seyreltildikten sonra yaygın spreyleme cihazları ile tüm yüzeye uygulanır. Optimum etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ilaçla kaplanması gerekmektedir. İlaçlama 1-3 bar basınçlı sırt pompaları ile yapılabilir. Daha büyük alanlar için hidrolik basınçlı spreyleme cihazları gereklidir. Optimum kontrol için ilaçlamadan sonra en az 6 saat, tercihen 24 saat kuru hava şartları gereklidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Legato Lenns isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup G ve Grup F1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Legato Lenns'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G ve Grup F1 hariç) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Hedef yabancıot kontrolünde Legato Lenns yeterlidir. Diğer ilaçlar ve gübreler ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LEGATO® LENNS

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP G VE F1 HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

250 g/l Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate IPA tuzu + 40 g/l Diflufenican

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ali TETİK
Ruhsatlandırma Müdürü

ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Cınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
808/809/810 Konak - İZMİR
Tel : 0 232 462 6140
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993



23 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

