

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarih ve no.su Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın tarih ve Sayılı Zirai Mücadele ilacı Ruhsatını haizdir.

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: MAGNOLIA SÜPER, çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğdayda tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancıotların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancıotların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCİOTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCİOTLAR	KULLANIM DOZU ve DÖNEMİ
Buğday	Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Boz tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus galacticus</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Kokulu sarı yonca (<i>Melilotus officinalis</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Kangal (<i>Silybum marianum</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>)	100 ml/da (Çıkış sonrası)

1)İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıstahlılır, harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlaçlı mahlülün hazırlanması: İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken depo su ile üst seviyesine kadar doldurulur. Boş ambalaj kapları su ile 3 kez çalkalanarak ilaçlı mahlüle ilave edilmelidir. İlaçlama süresince aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalı, ilacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

2)KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama zamanı: MAGNOLIA SÜPER, yabancıotlar çıktıktan sonra kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için, yabancıotların 2-3 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm'den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancıotların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır, ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç buğday ve yabancıotların aktif büyüme dönemlerinde olduğu erken uygulamalardan elde edilir.

Uygulama: MAGNOLIA SUPER, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile dekara asgari 20 litre su kullanılarak uygulanmalıdır. İlaçlı mahlülün yeknesak dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25°C'ler arasında olduğunda alınır.

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Geç uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Münavebe esnekliği: MAGNOLIA SÜPER, toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksitesisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Tarımda kullanılan birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak fiziksel olarak karışabilirliğin belirlenmesi için ön karışım testlerinin yapılması önerilir.

MAGNOLIA® SUPER

HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
Suda çözünen konsantre (SL)

120 gr/lt Dicamba =3,6-dichloro-0-anisic acid (dimethyl amonyum tuzu) ve
344 gr/lt 2,4-D = (2,4-dichlorophenoxy)-acetic acid

Şıçanlarad akut oral LD₅₀ 2,4-D: 639 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenmeden şüphe ediliyor ise derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız. İlaç ambalaj ve etiketini gösteriniz. Cilt teması halinde derhal bulaşık elbiseleri çıkarınız ve bu kısımları bol su ve sabun ile yıkayınız. Gözlere bulaşırsa, bol temiz su ile asgari 15 dakika yıkayarak temizleyiniz. İlacın teneffüs edilmesi halinde temiz havaya çıkınız. Konsantre ilacın ağız yoluyla çok miktarda alınması halinde ise tıbbi yardım isteyiniz, hastayı ilaç ambalaj veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.
Not: Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDODU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nin tescilli ticari markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

T.B. Yazısının Tarih ve No.su:

Basılı şerit (imal tarihi ve şarj no.su ile birlikte)

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarıyla su kaynaklarını kirletmeyiniz.
- Yeni ilaçlanmış sahalardan ot almayınız, hayvanları otlatmayınız.
- İlaç karışımını ihtiyaç kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaçlı mahlül kalırsa on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz. Yıkama suyunu nadas araziye püskürtünüz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne göre uygun olarak imha ediniz.
- Rüzgarlı havalarda 28°C'yi geçer ise daha serin olan akşam saatlerinde uygulama yapılmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: İlaç kapalı ambalajında, yem ve gıda maddelerinden ayrı, iyi havalandırılan serin ve kuru şartlarda, güneş ve rutubetten uzak bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz. Su, gıda ve yemleri bulaştırmayınız. -10 °C'nin altında ve +40 °C'nin üzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçıların hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsan Dede Cad. 700. Sokak

41480 Gebze/Kocaeli

Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)

Fax : (0262) 751 14 22

REV.0