



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MERPAN 80 WG®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

**%80 CAPTAN**

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**GENEL BİLGİLER:** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**CİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora başvurun.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ 'UZEM' TEL: 114**

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

ŞARJ NUMARASI:

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 23/02/2006 ve 5409

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	100 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Yaprakdelen ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	200 g/100 L su	14 gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	185 g/100 L su	14 gün
	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )		
Armut	Karaleke ( <i>Venturia prina</i> )	100 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Yaprakdelen ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	175 g/100 L su	14 gün
	Yaprak Kıvrıklığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	200 g/100 L su	

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

NET MİKTARI:

AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Captan
-------------	--------



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H351** Kansere yol açma şüphesi var.

**H400** Sucul ortamda çok toksiktir.

**H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

**P280** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

**P501** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Suları ürün ya da kabı ile kirletmeyin (Yüzey suları yakınlarında uygulama ekipmanlarını temizlemeyin/Çiftlik ve yollardan gelen suların kanalizasyona bulaşmasını önleyin)

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Yağlı ilaçlarla birlikte kullanılmaz.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MERPAN 80 WG®

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP	M4	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

%80 CAPTAN

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

- Elma karaleke:**1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),  
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),  
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,  
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 8 – 10 gün ara ile yapılmalıdır.

### Kayıtsız Yaprak Delen (Çil):

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,  
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),  
3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

**Domates Mildiyö:** Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Domates erken yaprak yanıklığı:** İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır ve şahit parsellerde en az %20 hastalık görülünceye kadar 10-12 gün aralıkla ilaçlamaya devam edilir. İlaçlama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.

### Armut karaleke:

- Dal sıracası yok ise 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında,  
2. uygulama beyaz rozet döneminde,  
3. uygulama çiçek taç yaprakların %70-80'i dökülünce,  
4. ve diğer uygulamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

### Şeftalide Yaprak Kıvrıklığı (Glok):

- 1.Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra  
2. Uygulama: İlkbaharda tomurcuqlar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

### Şeftalide Yaprak Delen (Çil):

1. uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,  
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MERPAN 80 WG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MERPAN 80 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 hariç) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

@ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisidir.

## ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

**Adama Makhteshim Ltd.**

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40