

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi. ( " )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarih ve no:

#### KULLANILDIĞI BİTKİLER, DOZ VE UYGULAMA

Bitki Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği	Dekara 100 ml.	21 gün
Soğan	Dekara 75 ml.	21 gün
Karnabahar	Dekara 150 ml.	21 gün
Narenciye	Dekara 250 ml.	21 gün
Armut	Dekara 250 ml.	21 gün

#### KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

**HEKTAŞ MENTOR®** tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 lt.su ile uygulanır.  
**AYÇİÇEĞİ** : Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.  
**SOĞAN** : İlk üç yapraktan sonra mum tabakası oluştuktan sonra, otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.  
**KARNABAHAH** : Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.  
**NARENÇİYE VE ARMUT** : Yabancı otlar çıkışından önce.

#### İLACIN HAZIRLANMASI :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

#### ETKİLEDİĞİ YABANCI OTLAR :

##### Dar Yapraklılar :

Püsküllü çayır (*Bromus sterilis*)  
Darıcan (*Echinochloa crus-galli*)  
Kirpi Darı (*Setaria spp.*)  
Çatal otu (*Digitaria sanguinalis*)  
Benekli Darıcan (*Echinochloa colonum*)

##### Geniş Yapraklılar :

Sirken (*Chenopodium album*)  
Çoban değneği (*Polygonum convolvulus*)  
Yabani hardal (*Sinapsis arvensis*)  
Domuz pıtrağı (*Xanthium spp.*)  
Karapazı (*Atriplex spp.*)  
Gelincik (*Papaver rhoeas*)  
Düğün çiçeği (*Ranunculus arvensis*)  
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (*Amaranthus retroflexus*)  
Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis*)  
Eşek marulu (*Sonchus spp.*)  
Yavşanotu (*Veronica hederifolia*)  
Kokarot (*Bifora radians*)  
Papatya (*Matricaria chamomilla*)  
Fare kulağı (*Anagallis arvensis*)  
Semizotu (*Portulaca oleracea*)  
Bambulotu (*Chrozophora tinctoria*)  
Köpek üzümü (*Solanum nigrum*)

# HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTAŞ MENTOR®

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)  
Emülsiyon konsantre (EC)  
240 gr/lt Oxyfluorfen  
2-chloro-3-alpha-trifluoro-p-tolyl-3-ethoxy-4 -  
nitrophenyl ether

Grup	E,14	Herbisit
------	------	----------

#### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

#### EVDE KULLANMAYINIZ

**ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ**  
**İLAÇ BUHARINI VE ZİRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**  
**İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ**  
**SİGARA İÇMEYİNİZ**

#### DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

**İLAÇLANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ .**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.**  
**ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.

**Yutma:** Fazla miktarda alınması halinde hastaya 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hastanın bilinci yerinde değilse kusturmayın ve ağızdan başka bir şey vermeyin. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora ilacın etiket bilgileri ile birlikte başvurun.

**Solunum:** Temiz havaya çıkın. Solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

®HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:  
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj  
no.su ile birlikte)

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı ; N:Çevre için Tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn :Zararlı

N :Çevre için Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

Oxyfluorfen

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R10: Alevlenir.  
R20/21:Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.  
R38: Cildi tahriş edicidir.  
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun  
S13:Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.  
S16:Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin.  
S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın.  
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.  
S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının.



REV.0

22 Aralık 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARAR EDİLMİŞTİR.





#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HEKTAŞ MENTOR® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için HEKTAŞ MENTOR®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

#### KARIŞABİLİRLİK:

Sethoxydim vb. dar yapraklı otlara etkili herbisitlere karıştırılarak kullanılabilir. Herhangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.

## HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTAŞ MENTOR®

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)  
Emülsiyon konsantre (EC)  
240 gr/lit Oxyfluorfen  
2-chloro-3-alpha-trifluoro-p-tolyl-3-ethoxy-4 –  
nitrophenyl ether

Grup	E,14	Herbisit
------	------	----------

#### KULLANIMLA İLGİLİ BİLGİLER :

Sudaki çözünürlüğünün düşük olması nedeni ile ilaç suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürler. Bu film tabakasının etkisini devam ettirebilmesi için HEKTAŞ MENTOR® uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işleme yapılmamalıdır. İlacın etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yok ise yağmur veya sulama gerekir.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :


- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
- Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlama ekipmanı ( depo, hortum, pompa vs. ) her ilaçlamadan önce ve sonra iyi bir şekilde yıkayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:** Kendi ambalajında, ağız kapalı olarak, normal şartlar altında serin kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçların kalitesini garanti eder. İlacın tavsiye dışı ve yanlış, uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan ilacın üreticisi sorumlu tutulamaz.

#### İMALATÇISI VE RUHSAT SABİHİ:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsan Dede Cad. 700.Sok.  
41480 Gebze/KOCAELİ  
Tel : (0 262) 751 14 12  
Fax : (0 262) 751 14 22



22 Aralık 2014

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

