Hazırlanması və tətbiq qaydası: Qeyri-qələvi gübrə və pestisidlərlə qarışdırılaraq tətbiq oluna bilər. Qarışdırmadan əvvəl bir qabda test etmək tövsiyə olunur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ VƏ MIQDARLARI:

BİTKİ ADI	İSTİFADƏ MİQDARI		İSTİFADƏ ZAMANI
	Yarpaqdan (ml/100 L su)	Damlama ilə	
GÜL	250-300 ml	10 L/ha	Qönçələnmə dövründən 20 gün fasilələrlə 3 tətbiq tövsiyə olunur.
MİXƏK	250-300 ml	10-15 L/ha	Cücərmə dövründən 20 günlük fasilələrlə 3 tətbiq tövsiyə olunur.
PAMİDOR, BİBƏR, XİYAR , PAMİDOR	250-300 ml	10-20 L/ha	Çiçəkləmədən əvvəl, meyvə tutma zamanı və meyvə yetişmə dövründə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
ALMA, ARMUD, ŞAFTALI, ƏRİK, ŞAFTALI, HEYVA, ALBALI, TURŞ ALBALI, SİTRUS, NAR, GAVALI	200-300 ml	10-20 L/ha	Çiçəklənmədən əvvəl, ləçəklərin tökildüyü vaxt, meyvə tutumu vaxtında və meyvənin diametri 6-7 sm-ə çatdıqda tətbiq etmək tövsiyə olunur.
LİMON	200-300 ml	10-20 L/ha	Tətbiq vegetativ inkişafdan və çiçəklənmədən əvvəl, ləçəklər düşəndə, meyvə tutumu vaxtında və meyvənin diametri 6-7 sm-ə çatdıqda tövsiyə olunur.
KİVİ	150-200 ml ********** 250-300 ml	10-20 L/ha	Vegetativ inkişafdan və çiçəklənmədən əvvəl tətbiq etmək tövsiyə olunur. ********** Ləçəklər düşəndə, meyvə tutma zamanı və meyvə diametri 6-7 sm-ə çatdıqda tətbiq etmək tövsiyə olunur.
BADAM, FINDIQ, PÜSTƏ, QOZ, ŞABALID	250 ml	10-20 L/ha	Çiçəklənədən əvvəl, ləçəklərin düşməsi zamanı, meyvələrin tutumu dövründə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
ZEYTUN	250-300 ml	10-20 L/ha	Qönçələrin formalaşması zamanı, çiçəkləmə, meyvələrin rənginin dəyişməsi vaxtı və lazım olduqda məhsul yığımından sonra tətbiq etmək tövsiyə olunur.
BAĞ (üzüm)	250-300 ml	10-20 L/ha	Çiçəkləmədən əvvəl, ləçəklərin düşməsi zamanı, meyvələrin rənginin dəyişməsi dövründə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.
ÇİLƏYƏK	200-250 ml	10-20 L/ha	İstixana tətbiqləri: Tətbiqlər bitkinin qış yuxusundan əvvəl, vegetativ inkişafın başlanğıcında, çiçəklənmədən 20-30 gün əvvəl, meyvə tutmadan 3-5 gün əvvəl və istehsal mövsümünün sonuna qədər hər 20 gündə bir tövsiyə olunur. Tarla tətbiqləri: Çiçəklənmədən 20-30 gün əvvəl, meyvə tutumundan 3-5 gün əvvəl, istehsal mövsümünün sonuna qədər hər 20 günə bir tətbiq tövsiyə olunur.
BANAN	250-300 ml	10-20 L/ha	12-14 gün ara ilə 2-4 tətbiq tövsiyə olunur. 1-2 yaşında olan gənc bitkilər üçün daha aşağı dozalardan istifadə edin. Çiçəkləmə, meyvənin düşməsi və formalaşması, rəng dəyişikliyi, don kimi kritik dövrlərdə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
KAHI	250 ml	10-20 L/ha	Sürpriz dən 10-15 gün sonra 20 günə bir tətbiq etmək məsləhətdir.
KƏLƏM	250 ml	7.5-10 L/ha	Əkindən sonra və 20 günlük fasilələrlə 2 tətbiq tövsiyə olunur. .
BUĞDA, ARPA, ÇOVDAR, YULAF	200-300 ml	30-50 L/ha	4-5 yarpaq dövründən çoxalmaya(çücərməyə) qədər və sonra 2 dəfə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
ÇƏLTİK	200-300 ml	İlk tətbiq: 4-5 L/ha İkinci tətbiq: 5-6 L/ha	Çoxalma(cücərmə) və çiçəkləmə dövründə 2 tətbiq tövsiyə olunur.
SOĞAN, SARIMSAQ	200-300 ml	-	Torpaq altında inkişaf etməyə başladıqda sonra hər 20 günden bir bakırlı (mis) qarışımı ilə tətbiq etmək tövsiyə edilir.
KARTOF	200-300 ml	5-7 L/ha	Bitkilər 15 sm hündürlüyə çatdıqda və kök yumruları fındıq ölçüsünə çatdıqda tətbiq edin və 15 gündən sonra təkrarlayın.
ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU, ISPANAQ	250 ml	5-7 L/ha	Əkin etdikdən sonra 15-20 gündən başlayaraq hər 20 günde bir tətbiq etmək tövsiyə olunur.
KÖK	300-400 ml	5-7 L/ha	Köklər qələm ölçüsünə çatdıqda, hər 2-3 həftədən bir 3-4 tətbiq tövsiyə olunur.
CƏFƏRİ	250-300 ml	5-7 L/ha	Köklər qələm ölçüsünə çatdıqda, hər 2-3 həftədən bir 3-4 tətbiq tövsiyə olunur.
SOYA, FISTIQ, TÜTÜN, QARĞIDALI, MƏRCI	250-300 ml	5-7 L/ha	Əkindən 25 gün sonra 15 günlük fasilələrlə 3 dəfə tətbiq etmək tövsiyə olunur.
QABAQ, QARPIZ, QOVUN	100-250 ml	3 L/ha	4-5 yarpaq dövründə, çiçəklənədən əvvəl, meyvə tutma və meyvə yetişmə dövründə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.
PAMBIQ	-	2-3 L/ha	Çiçəklənmədən əvvəl və sonra 3-4 yarpaq dövründə 3 tətbiq tövsiyə olunur.
GÜNƏBAXAN	-	2-3 L/ha	Çiçəklənmədən əvvəl, 3-4 yarpaq dövründə 2 dəfə tətbiq etmək tövsiyə olunur.

weBBa SL

PLAYER

Heyvan mənşəli amin turşusu olan maye üzvi gübrə

Zəmanətli məzmun	(%w/w)
Üzvi Maddə	62
Üzvi Karbon	21
Üzvi Azot (N)	10
Ümumi Amin Turşuları	45.5
Sərbəst Amin Turşuları	14
pH	6-8

UNICERT ISO 9001:2008

Xalis çəki: **1 L / 1.25 Kq**

İstehsalçı Firma
Webba Kimya A.Ş.
AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cad. No:29
Döşemealtı/ANTALYA/TÜRKİYE
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88
www.webbakimya.com
info@webbakimya.com

Saxlama və xəbərdarlıqlar:
Öz qablaşdırması altında sərin və quru şəraitdə (minimum +0°C -dən + 30°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq hüdudlarından kənarda dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

XƏBƏRDARLIQLAR:
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.
UŞAQLARDAN və QİDALARDAN UZAQ TUTUN.
DƏRİ VE GÖZƏ TƏMAS ETDİRMƏYİN
YALNIZ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.
HEÇ BİR HALDA UYGUN GÖRÜLEN MIQDARDAN ARTIQ TƏTBIQ ETMƏYİN.
TOPRAQ VƏYA YAPRAQ ANALİZİ EDİLDİKDƏN SONRA GÜBRƏNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ TÖVSİYƏ OLUNUR.

İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilib.
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilib.
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilib.

Xalis çəki: **1 L / 1.25 Kq**

EMA

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
EMA QSC
Sabunçu qəsəbəsi, şəhər sossesi
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Tel: (+994 12) 450 34 17
info@emaagro.com
www.emaagro.com