

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile
Ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarihi ve no.su: 17.06.2005/5143

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	150 g + 1000 g şeker/ 100 L su
Domates (Sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	200 g/100 L su
*Turunçgiller	Limon çiçekgüvesi (<i>Prays citri</i>)	200 g/100 L su
Kiraz	Elma yaprakbükene (<i>Archips rosanus</i>) Adi yaprakbükücüsü (<i>A.xylosteanus</i>)	200 g/100 L su

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

ETKİ ŞEKLİ:

Rebound Bioinsecticide WP bilhassa Lepidoptera takımı familyası olmak üzere birçok böceği mide yolu ile öldürür. Ölümün olabilmesi için ilaçlı kısmın böcek tarafından yenmesi gereklidir. İlaçlı yaprağı yiyen böceğin birkaç saat sonra yemesi durur fakat ölmeyebilir. Larvaların canlı kalması demek zararın devam etmesi demek değildir. Zira ilacı midesine alan böcek artık zarar veremez duruma gelir. İlacın etkisini tam göstermesi için iyi bir ilaçlama yapılması ve kullanıldığı bitkinin bütün yeşil aksamının (yaprakların) ilaçlanmış olması gereklidir. Zararlı yoğunluğu, bitki büyümesi ve zararlının dönemi gözönüne alınarak ilaçlama 7-14 gün ara ile tekrarlanmalıdır. Faydalı böceklerle zararlı böcekler arasındaki dengeyi bozmayacağına doğa mücadeleye de katkıda bulunmuş olur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

30 Temmuz 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Rebound® Bioinsecticide WP

Islanabilir toz (WP)

Grup	-	Biyolojik insektisit (Böcek ilacı)
------	---	------------------------------------

16000 IU/mg *Bacillus thuringiensis* var. kurstaki

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR

ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 4 SAAT İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR.

İLK YARDIM: Etkilenme halinde ilaçlama sahasından uzaklaştırın. Cilde veya göze teması halinde bol miktarda su ile yıkayınız. Tahrişin veya zehirlenme belirtilerinin devam etmesi halinde, tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmeliğe göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Sulandırma ilacını, ilaçlama aletinin deposunda 12 saatten fazla bekletmeyiniz.
- Birden fazla karışımlarda karıştırma işlemi asla durdurmuyunuz, hazırlar hazırlamaz derhal kullanınız.
- İlacı ve ilaçlı mahlülü her türlü su kaynağına buluşturmayınız.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ: İlk larvalar yumurtadan çıkar çıkmaz derhal tatbik edilmelidir. Hatta çıkışlardan 1 gün önce atmakta yarar vardır. Mide yoluyla etkili olduğundan larvanın ilaçlı ortamda beslenmesi gerekmektedir. İlaçlı kısım ağız yoluyla alındığında içindeki bakteri ilk ½ saat zarfında felç yaparak larvanın beslenmesini durdurur. Birkaç saat zarfında sindirim sistemini parçalayarak Delta Endotoxin adındaki zehir oluşur ve larvayı öldürür. Bazen ölüm 3-5 gün zarfında meydana gelir.

Domates (sera) Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren serada (1 tuzak/sera) eşeyssel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Turunçgiller: Meyveler yumurta bırakma olgunluğuna gelince (3-5 cm çapı) uygulamaya başlanır. Kaplama olarak ve özellikle meyveler iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılır. Bulaşıklık devam ederse ilaçlama tekrarlanır.

Kiraz: Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama olarak 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde; erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde, larva ile bulaşma oranı %5'i geçince ilaçlama gerekir.

KARIŞILIRLIK: Tek başına kullanılır. Diğer bitki koruma ürünleri ve gübrelerle karıştırılmaz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Rebound® Bioinsecticide WP

İslanabilir toz (WP)

Grup	-	Biyolojik insektisit (Böcek ilacı)
------	---	------------------------------------

16000 IU/mg *Bacillus thuringiensis* var. kurstaki

DEPOLAMA DURUMU :

Rebound Bioinsecticide WP orijinal ambalajında serin, kuru ve havadar bir yerde kilit altında saklanmalıdır. Bakteriyel sporlar ihtiva eden biyolojik bir insektisit olduğu için sıcağtan zarar görebilir. Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

Shandong Lukang Biological Pesticides Ltd.
No.3, Youyi Road, Qihe, Shandong, China

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700.Sok.
41480 Gebze-Kocaeli
Tel: (0 262) 751 14 12
Fax: (0 262) 751 14 22

30 Temmuz 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

