

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 14.02.2012/8577



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Arpa	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) İtalyan siğirdilli (<i>Anchusa azurea</i>) Yatık boya kökücü (<i>Asperugo procumbens</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) San ot (<i>Boreava orientalis</i>) Rum yalancı keteni (<i>Camelina rumelica</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Boynuz otu (<i>Cerastium dichotomum</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Kıraç itiri (<i>Geranium stepporum</i>) Sarkık meyveli yavruağı (<i>Hypocoum pendulum</i>) Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Yabani hardal (<i>Neslia apiculata</i>) Trakya hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Yabani hardal (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Süpürge otu (<i>Vicia narbonensis</i>) Kaba fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Adi fiğ	50 ml/da	14 gün
Buğday Arpa	Tarla papatyası (<i>Anthemis fumariifolia</i>) Saka dikenli (<i>Carduus pycnocephalus</i>) Tarla hazerani (<i>Consolidia regalis</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Meryem dikenli (<i>Silybum marianum</i>) Parmaklı yavşan otu (<i>Veronica triphyllos</i>)	60 ml/da	14 gün
Buğday Arpa	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	14 gün
Mısır *	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Kırmızı köklü tilki (<i>Amaranthus retroflexus</i>) kuyruğu (<i>Aristolochia maurorum</i>) Uzun loğusa otu (<i>Chenopodium album</i>) Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Yatık sirken (<i>Centaurea depressa</i>) Peygamber çiçeği (<i>Gallium aparine</i>) Dil kanatan (<i>Ipomoea stolonifera</i>) Gecesefası (<i>Salsola kali</i>) Adi soda otu (<i>Solanum nigrum</i>) Köpek üzümü (<i>Xanthium strumarium</i>) Domuz pıtrağı	70 ml/da	14 gün
Mısır *	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da	14 gün

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve seker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

Resital® Duo

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

**452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuşukluk görülebilir. Deri ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde Kusturmayın. Doktor çağırın ve/veya acil servise nakledin. Kusturup, kusturmama kararını doktor tarafından alınmalıdır.

Gözle temas etmesi halinde Hemen, su ile en az 5 dakika süreyle iyice yıkayınız.

Ciltle temas etmesi halinde Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak akan suyun altında veya duşa yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Solunması halinde Temiz havaya çıkarın. Bir doktora danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Doktor yargısına göre destekleyici tedavi/bakım uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

© HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nin tescilli markasıdır.

İÇİNDEKİLER:

2,4-D Ethylhexyl ester
Florasulam

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700.Sok.
41480 Gebze/KOCAELİ
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0 262) 751 14 22



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

18 Ocak 2018

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Resital® Duo uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Resital® Duo adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisitlerdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Resital® Duo**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 + B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı herbisitlerden Fenoxaprop-p-ethyl terkipli ürünlerle karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı herbisitler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Chlorpyrifos-methyl terkipli ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfor ve potasyum terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Resital® Duo

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

**452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Uygulama sonrasındaki sıcak ve nemli şartlar ürünün etkisini artırıp hızlandırırken kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmur ürünün etkisini azaltmaz.
- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için uygulamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
- Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.
- Boşalan ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700.Sok.
41480 Gebze/KOCAELİ
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0 262) 751 14 22



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

18 Ocak 2018

