www.iqcworld.com.mx

İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər

Bitki adı	Ziyanvericilərin adı	Məsarif norması	Son dərmanlama ilə yığım arasındakı müddət
Alma	Alma qurdu (Cydia pomonella)	20 ml / 100 lt. su sürfə	7 gün
Armud	Yarpaq birəsi (Cacopsylla pyri)	20 ml / 100 lt. su Laçaklər tökülməndən sonra 2ci və 3cü kuklaciq dövründə dərmanlama apanlır.	7 gün
Gilas	Gilas milçəyi Gilas ağac qurdu (Comlus comlus)	30 ml/100 lt su, yetkin	7 gün
		80 ml / 100 lt. su gənc sürfə dövrü	7 gün
Taxıl	Zərərli bağacıq (Eurygaster integriceps)	20 ml / da 1-3 dövr pupa 30 ml / da 4-5 dövr pupa və yeni nəsil yetkin	7 gün
Dekorativ bitkilər	Nərgiz soğan milçəkləri (Eumerusnarcissi, Merodoneques)	80 ml / 100 lt. su (Tarla dövründə)	7 gün
Günəbaxan	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	40 ml / 100 lt. su, sürfə	7 gün
Pomidor	Ağ kəpənək (Bemisiatabaci)	30 ml/da, sürfə - yetişkin	7 gün
	Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera)	30 ml/da, sürfə	7 gün
Badımcan	Ağ kəpənək (Bemisiatabaci)	30 ml/da, sürfə - yetkin	7 gün
Qarğıdalı	Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia spp.)	30 ml / da, sürfə (15 gün ara ilə 3 dərmanlama) (Yumurta ilk görülдüyündə dərmanlamaya başlanılır.)	7 gün
	Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis)	30 ml/da sürfə (15 gün ara ilə 3 dəfə)	7 gün
	Çuğundur adi uzunburunu (Cassida	30 ml/da	7 gün

*İstehlak məqsədli üzüm yarpağı yığılan yerlərində istifadə edilə bilməz.

INSEKTISID

AgroIQC

SIERRA 25 EC

Aktiv madde: 250 qr/lt Cypermethrin
Preparativ forması: Emulsiya konsentratı (EC)
Özəllikləri: Kontakt və mədə zəhəri təsirli sentetik pretroidli bir insektisiddir. Qidalanmanı dayandıran təsirə malikdir.
Qablaşdırma: 1lt, 100ml, 250ml, 5lt

BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə dozasini nəzərə alaraq bitki mühafizə preparatı önce ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının çani yarıya qədər suyla doldurulur. Aparatın qarıştırıcısı çalışırkən dərmanlı su çəne əlavə edilir. Qarıştırmağa davam edilərək çən suyla tamamlanır. Çiləmə tamamlananа qədər qarıştırmağa davam edilir. Hazırlanan bitki mühavizə preparatı eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır.

TƏNZİMLƏMƏ: Çiləmədən önce çiləyici aparatının tənzimləsi aparılmalıdır. Çiləmələrdə tam bir örtülməni təmin edəcək şəkildə dərmanlı su miqdarı tənzimlənməlidir. Çiləmələr günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitlərində aparılmalıdır.

Dərmanlama aparatının təmizliyi: Çiləmanin tamamlanmasından dərhal sonra çiləyici aparatının çani etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çəne təmiz su doldurulduqdan sonra qarıştırıcını və püskürtmə sistemini çalıştıraraq bütün hissələrinin yuyulmasını təmin edin. Yuma işini su mənbələrinin yaxınlığında aparmayın. Yuma suyunu və tullantıların su mənbələrinə boşaltmayın.

BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏ ŞƏKLİ:

Alma qurduna qarşı aparılacaq çiləmələr proqnoz və erkən xəbərdarlıq sisteminə görə yönəltməlidir. Alma qurdu mübarizəsində hədəf, hər zoğa aid sürfə çıxışı müddətində ağaqları dərmanlı tutaraq, yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə girmədən önce öldürməkdir. Armudda proqnoz və erkən xəbərdarlıq sistemina diqqətə alınmır.

Armud yarpaq birəsinə qarşı qışlayan zoğ yetişkinlərinin buraxtığı yumurtaların dərhal tamamının açılıb ikinci və üçüncü dövr kuklacıklar görülməyə başlandığı, sürgünlərin %15-dən daha çox bulaşma görülməyə başladığında, şirintəhər maddə axıntısı başlamadığı və təbii düşmanların çox olmadığı zamanda bir çiləmə yetərli ola bilər.
Gilas milçəyinə qarşı ortülmə dərmanlamada butun ağacın və meyvələrin, böyük ağacların xüsusilə təpədəki budaqlarının dərmanlamasına diqqət edilməlidir.
Gilasda ağacovana qarşı bulaşmış bəxçələrdə tələər asılaraq, yetkin çıxışları görsənir. Yetkin çıxışı sonunda və ya ağac gövdə qabıqlarının altında koloniya halında olan gənc sürfələr görülдüyü avqust ayın ortası və sentyabr ayın əvvəli dərmanlamalara başlanılır. Dərmanın təsiri müddətina görə ikinci dərmanlama apanlır.
Taxılda bağacığa qarşı bağacığ tarlalarda apanlan sayımlar və dəyərləndirmələrə görə kimyavi mübarizəyə qərar verilir.
Qarğıdalı qurdu və qarğıdalı kəpənəyina qarşı ilk yumurta görülдüyündə çiləmə apanlır. İlk çiləmeni təqribən 15 gün ara ilə 3 çiləmə daha apanlır.
Günəbaxanda pambıq sovkasına qarşı 100 bitkidən 5-ə yumurta, birinci dövr sürfə və ya ilk zərər əlamətləri görülдüyündə dərmanlamaya başlanılır.
Pomidorda, Noxut və Mərcidə pambıq sovkasına qarşı tarlaya diaqonal yönündən girilib, tarlanın böyüklüyüna görə 50-100 bitki kontrol edilərək, bitkinin çiçək, yarpaq, zoğ, meyvə və sürgünlərində yumurta və sürfə axtarılır. 100 bitkiden 5-i yoluxmuş olduğu halda çiləmə apanlır.
Pomidor və Badımcanda Pambıq ağ kəpənəyinə qarşı yoluxmuş tarlaya diaqonal yönündən girilir. Böyük yarpaqlı bitkilarda hər 5 adımda bir alt, orta və ust yarpaqlardan olmak üzərə 50 yarpaq yığılır. Yarpaq başına 5 sürfə və kuklacık olduğunda çiləmə apanlır.
Mərcimakta paxlakimilərin toxum böcəklərinə qarşı yoluxmuş sahələrdə çeşidin inkişafı və əkin zamanı göz önündə saxlanılaraq alt kapsullar quru oluma girərək 10-14 gün ara ilə 2-3 dərmanlama apanlaraq tarla dövründəki yoluxmaların qarşısı alınır.

Dekorativ bitkilərdə nərgiz soğan milçəklərinə qarşı bitki boyu 10 sm olduğunda tarlanı temsil edəcək şəkildə hər dekar üçün təqribi 1000 soğan kontrokdan keçirilməlidir və yoluxma ortamı 5% taşkil edirsə mübarizə aparılmalıdır. Yetkin çıxışları başladığında hər iki zərərli üçün ilk çıxışdan 10 gün sonra ilk dərmanlama aparılmalıdır.
Bağ salxım güvəsinə qarşı salxım güvəsi uyğulama zamanları proqnoz təxmin-xəbərdarlıq sisteminə görə müəyyən olunur. Larvisid tətbiqi üçün tələlərdə tutulan kəpənək say ən yüksək nöqtəsinə çatıb düşməyə başlamalıdır. təsir edici istilik cami 1-ci zoğda 120 gün-dərəcə, Alaqaranlıq temperaturları üst-üstə 2 gün 15 C və daha çox olmalı, bu hal iralidə gələn günlərdə də davam etməlidir. Təsiri istilik cami 2-ci zoğda 520 gün-dərəcə, 3-cü zoğda 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenologiyası 1-ci zoğda çiçək tumurcuğu, 2-ci zoğda qonuq, 3-cü zoğda şirinləmə başlanğıcı dövrdə olmalıdır. İlk sürfə çıxışı görülдüyündə çiləməyə qərar verilir. Hər zoğda bir çiləmə apanlır.
Çəyirtkələrə qarşı rezervasiya (Garsiyar) sahələrində zərərli çəyirtkə kuklacıkların görülməyə başlamasından və apanlan sorğularla, müvafiq sıxlıq müəyyən edildikdən sonra dərhal kimyavi mübarizəyə keçirilir.
Dayanma ilə əlaqəli məlumat: Sierra 25 EC adlı bitki mühafizə preparatı təsir mexanizminə görə Qrup 3A olaraq siniflendirilmiş bir insektisiddir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki mühafizə preparatlarının təkrarlanan çiləmələri, dayanma inkişafını təşviq edilməkdədir. Bu səbəbdə, dayanma inkişafını gecikdirmək üçün **Sierra 25 EC**'ninayn istehsal sezonu daxilində tövsiyə edilən cami çiləmə sayısını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 3A xarici) bitki mühafizə preparatlarının istifadəsinə xüsus göstərin.

Qarışdırılma şərtləri: Qüvvəti qəlvi xosiyyəti bitki mühafizə preparatları xarıc bəzi bitki mühafizə preparatları ilə qarışa bilər. Böyük miqdarda qarışım etmədən önce ön qarışım testi edilməsi tövsiyə olunur.

Önce etiketi oxuyun.
- Evdə istifadə etməyin.
- Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
- Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin.
- Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə bitki qoruma preparatı quruyana qədər insan və heyvan buraxmayın.
- İnsan və ətraf mühitə dəyə bilməsə risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.

TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.

İstifadə olunmuş bitki qoruma məhsulunun boş qabını dörddə bir hissəsina qədər təmiz su ilə dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləmə çanina boşaldın. Üç dərə təkrarlayın.

ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ:
Bitki qoruma məhsulunun udulması halında vücud hərəkətlərində balanssızlıq, konvulsiya tipli sinir əlamətləri görülür. Daşınma və çiləmə zamanı artıq miqdarda dərıyə bulaşsa, özəlliklə üz hissəsinda olmaq üzrə dəridə uyuşma, yanma və hissizlik kimi keçici dəri hassaslıq əlamətləri ortaya çıxa bilər.

İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzinde göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduğu təqdirdə həkima müracıat edin.
Dəri: Təmas halında çirklenmiş geyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyi vücud hissələri bol su və sabun ilə yuyun. Həkima müracıat edin.
Udma: Dərhal tibbi yardım göstərin. Dərmanın mədədən çıxanılmasına həkim qərar verməlidir. Şüuru qapalı xəstəyə ağızdan heç bir şey verməyin və qusdurmayın.
Nəfəs alma: Zərər görən insan təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs alma çətinliyi mövcuddursa oksigen verin, nəfəs almırsa süni tənəffüs edin. Həkima müracıat edin.

ANTİDOTU VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur.Zəhərlənmə halında əlamətlərə görə müalicə tətbiq olunur.

ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H226 Alovlanan maye və buxar
H302 Udulması zərərlidir.
H312 Dəri ilə təmas halında zərərlidir.
H315 Dəri təhrişine yol açar.
H332 Nəfəs almaSolunması halında zararlıdır.
H335 Solunum yolu təhrişine yol açabilir.
H410 Su mühitində uzun zaman qalıcı, çox toksik təsir.

TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P210 İstidən/qığılcımdan/alovdan/isti səthlərdən uzaq saxlayın. – Siqaret çəkməyin.
P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P302+P352 DƏRİ İLƏ TƏMAS HALINDA İSƏ: Bol sabun və su ilə yuyun.
P261 Tozu/dumanı/qazı/buxarı/spreyi ilə nəfəs almaqdan uzaq durun.
P273 Ətraf mühitə verilmesindən uzaq durun.
P501 İçindəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.

İSTİFADƏ VƏ AMBARLAMA ZAMANI DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSLAR:
- Arılar üçün zəhərlidir. Preparatdan çiçəklənmə zamanında istifadə etməyin.
- Balıqlar üçün zəhərlidir. Yeraltı və yerüstü sulara bulaşdırmayın.
- İyi havalandırılan mühitdə, sərin yerdə, möhkəm bağlı qabda və qıfıl altında mühafizə olunmalıdır.
- Boşalan qablardan başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin.

AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 4 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.

Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.

İdxalçı:
EMA MMC şirkəti
Şəhər şossesi, Sabunçu
370034 Bakı, Azərbaycan
+99412 450 34 17

İstehsal tarixi: 17.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya nömrəsi: N-IQC-170219375390-253

İstehsalçı: INTERNATIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
Ünvan: Av. Cuahutemoc 1475-1, Col. Santa Cruz Atoyac, Mexico DF
Telefon: 13141176/56057992/13141931/56059246 Faks: (0155) 13141429/56057999

HDPE

Xa – zərərli
R – fraza: R22, R36/37/38
S – fraza: S2; S13; S20/21 S26; S46

1Le