



Aktiv maddə: %5 Emamectin Benzoate
Preparatıforması: Suda həl olunan qranullar
Özəlliklər: Emamectin benzoate, yarpaqlardan qidalanan Lepidoptera sursifasına yüksək dərəcədə təsirli olub sürfələrin sınır sistemini blokl edir. Bu halda sürfələrin qidalanması dayanır və zərərvericilər ilic olur. Sürfə ölümlü maksimum 4 gün ərzində baş verir. Sombroero 5% WDG güvən bir zahar olaraq kontakt təsire sahibdir.

Əvvəlcə yoxluğu oxuyun

- Evdə istifadə etməyin
- Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
- Dərman buxan və zərərli ilə tənəffüs etməyin
- Maska, qoruyucu geyim, əlcək və gözlükdən istifadə edin
- Çiləmə əsnasında heç bir şey etməyin
- Sığortə çəkməyin
- Dərmanınla sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır.
- İnsan və Ətraf sağlamlığı üzərində RİSKLƏRİ qarşısını almaq üçün tövsiyə edilən ŞƏKİLDƏ VƏ TÖVSIYƏ EDİLƏN dozada istifadə etməlidir

Tövsiyə edilən preparatların başqa digərforin istifadəsi qəti qadağandır. Zərərhalda əməllər: Dəri, göz, burun və boğazda çıcaqlama ilə bəli.

İlk yardım tədbirləri

Göz: Təmas halında tədbir ifadələrini (P305+P351+P338) baxın.
Dəri: Təmas halında geyimi çxarın. Dərman dəyən bədən qisimlerini 15-20 daqiqə bol su və sabun ilə yuyun. Çıcaqlama və hassaslıq halında həkime müraciət edin.

Boğazdan keçir: Boğazdan keçməsi halında tədbir ifadələrini (P301+P312) baxın.

Qaxılma vasitəsi: Təsirə maruz qalan şəxs təmiz havaya çıxarılmalıdır. Tənəffüs çətinliyi varsa oksigen verin, tənəffüs dümursə süni tənəffüsü etdirin. Həkiminizlə əlaqə saxlayın.

ANTİDOTU Müalicə və Xüsusi antiodot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tədbiri olunur

DİQQƏT EDİLƏCƏK İFADƏLƏR
H302 Boğazdan keçməsi halında zərərli H319 Ciddi göz çıcaqlanmasına səbəb olur. H332 Solumasına halında zərərli. H410 Su mühitində davamlı, zərərli təsir.

TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P273 Ətraf mühitə yayılmama təv verməyin P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucu / üz qoruyucu istifadə edin.
P301+P312 Boğazdan keçməsi halında: Özünüzi yaxşı hiss etməyinizə Təcili yardım mərkəzinə və ya / həkiminizə zəng edin.
P305+P351+P338 Göz ilə təmas halında: Bir neçə daqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt lınzalan əlavə və hazırlanmış rəngli kollarından qaçın. İstəməyə davam edin.
P501 İlgincdi məzmunu / konteyneri müvafiq qaydalar uyğun olaraq atın.

İstifadə edildiyi bitki və xostəllilər

| Bitki adı | Ziyanvericilərin adı | Məsarif norması |
|---------------------------|--|--|
| Bibar (istixana) | Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis) | 300 ml/ha sürfə |
| Pomidor (tarla, istixana) | Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) | 300ml/1000 l su sürfə |
| Üzüm | Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana) | 250 ml/1000l su sürfə |
| Xiyar (istixana) | Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis) | 300ml/1000 l su sürfə |
| Badmcan (istixana) | Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis) | 300ml/1000 l su sürfə-- |
| Pambıq | Afrika pambıq sovkası (Spodoptera littoralis) Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) | 350 q/ha, sürfə 400 q/ha, sürfə |
| Carnation | Afrika pambıq sovkası (Spodoptera littoralis) Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) | 300 q/1000 l water, sürfə 300 q/1000 l water, sürfə |

EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etməz dair təlimlərə riayət edin.

DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:

Tövsiyə olunan preparat lazəm miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq hal edilir.Çiləyinin çanı yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyən-səyən çənə töküür.Qarşdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma davam etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul homin gün istifadə olunmalıdır.

Tənzimlənməsi:
Təbiiçin əvvəl çiləyi aparatının tənzimlənməsi aparılmalıdır. Xüsusi sahədə təbiiçin oluncaq qarşıq miqdard təbiiçilərdə yaxşı bir önlük təmin etmək üçün düzəltməlidir. Təbiiçin suyun səaltından,külsəks və ya az küldəli hava şəraitində edilə bilər.

ÇİLƏYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:
Dərman preparatının istifadəsindən təmizləndicdən sonra çiləyicinin içarisində olan dərman preparatının tamamilə boşalmasınından əmin olun. Çiləyicinin çanına təmiz su dolduraraq qarışdırıcıni işə salmaqda bütün hissəcikləri yayaxalayın. Yayaxalma işlerini su kanallanna yuxun aparmayın. Yayaxalanmış suyu su kanallanna boşalmayın.

BITKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:

Bibar (istixana), Xiyar (istixana), Badmcan (istixana), Dərmanlama, 100 bliktdə 1-2 yeni aqlmış yumurta paketi və ya 4-5 sürfə gürüldüyündə edilə bilər. Sürfələr yarpaq üzünə dağılındıran dərmanlama edilə bilər.

Pomidor (istixana). Sürfələr meyvəyə daxil etmədən, dərmanlama 100 bliktdən 5 denesinin bulanmış olması halında dərhal mübarizəyə başlanın.

Bağ salxım güvəsinə qarşı salxım güvəsi təbiiçin zamanları təxmin-əvəsərdəki sistemine görə mübarizə edilir.Lənavsit təbiiçin üçün tələfədən tutulan kəpənek sayı tapır nöqtəsinə çatıb, düşməyə başlamalı, təsirli istilik məbləği 1,dökdə 120 gün-dərəcə, toran istilikləri üst-üstə 2 gün 15 ° C və üzərində olmalı, bu vəziyyəti irəliləyən gündərdə davam etməlidir. Təsirli istilik məbləği 2,dökdə 520 gün-dərəcə, 3,dökdə 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenolojişi 1,dökdə çiçək turmurcuğu, 2,dökdə quru, 3,dökdə talanma başlanğıcı dövründə olmalıdır. İki sürfə çuxu gürüldüyündə İlaçlamaya qərar verin. Hər Dole bir təbiiçi edilir.

Pambıqda pambıq yarpaq qurdu ilə mübarizədə ən yaxşı təsir üçün yumurtaların aqlığıdır. Müvafiq dərmanlama edilmiş uygundur. Müvafiq dövrdə zərərvericilərin Konsentratıyasından əsli olaraq, zəruri hallarda dərman 10-15 gün arasında təkrarlanmalıdır.

İNSEKTİSİD



SOMBRERO

Pambıq yaşı qurdu: Pambığın tarama dövründə yumurta populyasiyasının artması başlanın. Nümunə üçün 50 dekarlık pambıq tarlası bir modul qəbul edilür və təxminən olaraq bir-binə bərabər üç hissəyə ayrılır. Hər hissədə təsəddüi seçilən 3 m sıra uzunluğundakı bütün bitkilər nəzarət edilərək Yaşıl qurd yumurta və sürfələri sayılır və 3 m-lik sıra uzunluğunda orta 2 sürfə tapıldıqında dərmanın mübarizəyə qərar verilir. Ancaq əsas dövr inkişaf dövrü olaraq adlandırılan bu dövrdə, pestisidlər, iki növbədə, düşmə təbiiçini və yeni xədarı yaratmaqda özünü yeniləmək potensialını alaraq, pestisidli püşkürmək qərarına gəlir. Buraxılan yumurta sayı artdığı müddətdə dərmanlama ediləməlidir. Ancaq bu müddət Yaşıl qurd sürfələrinin çox böyüməsinə imkan verəcək qədər uzun olmalıdır. Dərmanın mübarizədə ən yaxşı effekti əldə etmək üçün hər dökde yumurtadan yeni çıxmış sürfələrin əksəriyyəti öldürüldü dövrə yaxşı təyin olmalıdır. Sürfələr gürüldüyü ümumiyyətlə daraq, çiçək və bərama içində başlandıyı üçün dərmanlama səhər erkən saatlarda və ya axşam gec saatlarda edilə bilər. Qəranfil pambıq yarpaqçurdu: Üç metr uzunluğundakı bir sradə 5-6 ədəd sürfə və ya 1 yumurta paketi tapıldıqında mübarizəyə keçilməlidir. İlaçlamada yaxşı bir noticə əla bilmək üçün, dərmanlama 1-3 dövr sürfələrə qarşı edilə bilər. İstilik dövrəki sürfələrə qarşı edilən ilaçlamalarda kaf noticə əlma bilnəz.

Qəranfil yaşı qurd 100 bliktdən 5 denesinin bulanmasıhalında dərhal mübarizəyə başlanın.

DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Sombroero 5% WDG adı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Grup 6 olaraq təsnif bir insektisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar müqavimət inkişafını təşviq edir. Buna görə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Sombroero 5% WDG -un eyni istehsal mövsümündə təkrif olunan təbiiçin ürümü sayını aşmayın. Təbiiçin təkrarlanması lazəm olduğu hallarda isə, fərgli təsir mexanizminə sahib (Grup 8 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə ediləsinə diqqət edin

QARŞIDIRILMASI: Bəz çox standart insektisid və funisidrlə qarşdırıla bilər. Böyük miqdarda qarşıq etmədən əvvəl fiziki qarşıqabılıqlı testlərinin ediləməsi lazımdır.

İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək əməllər.
• Bütün dərmanlardan olduğu kimi, dərmanlama əsnasında mümkün qədər dərman ilə təmasdan çəkinin.
• Anlara zərərliədir.
• Dərman buxarlanın nəfəs almayın.
• Sullara bulanılmayınız, paltarlara və anlara zərərliyin. Faydalı təbiiçin 48 saat sonra salınmalıdır.

Dərmanlama Sonrası Tədbirlər:
Boş ambalajları qaydalarla uyğun olaraq bertarət edin. Yenidən istifadə etməyin. İstifadə ediləməyən dərmanı qaba içarisində, ağız bağılı olaraq, uşaqları çala biləcəyici bir yerdə və qidalardan uzaqda, kildi altında saxlayın. Yıkanmış, iş paltarı dəyişdirin və yuyun. Qab-qaçaq alət və avadanlıqlar sabun və ya sodalı su ilə yuyun.

Saxlama şəraiti:
Normal (sarı və quru) şərait altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanınız fiziki, kimyəvi və bioloji vəziyyətinə görə bir dəyişikliklər olmur

SİRKƏT BƏYƏNMƏSİ: Orijinal ambalajında salınmış üzvi istehsalat məhsulların keyfiyyətinin təmin edir. İstehsalatçı məhsulların düğün saxlanması və ya düğün təbiiçin edilməsinə və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyanı görə məsuliyyət daşıdır.

İlxalq: EMA MMC şirkəti Şəhər sərəsi, Sabuncu 370034 Bakı, Azərbaycan +99412 450 34 17



İstehsal tarixi: 14.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya nömrəsi: M-QCC-14021937729-253

İstehsalçı: INTERNATIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
Urşvan: Av. Cuahuatlenco 1475-1, Col. Santa Cruz Atoyac, Mexico DF - Mexico
Telefon:
13141176/56057992/13141931/56059246
Faks: (0155) 13141429/56057999



400gr e

