

**Herbisid:**

Sistem təsirli olub, çıxışdan əvvəl və sonar tətbiq olunan selektiv herbisiddir.
İstifadədən əvvəl yarıqlı diqqətlə oxunmalıdır! Uşaqların əldə edə bilmədiyi bağlı yerdə qorunmalıdır!

Xəbərdarlıq: Yarıqlıda tövsiyə olunanlar ümumi rəhbərlik üçün nəzərdə tutulub. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitdən asılı olaraq fərqli nəticələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıyır

Bitki mühavizəsi preparatı:

Sistem təsirli olub çıxışdan əvvəl və sonra tətbiq olunan selektiv herbisiddir. Əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı bitkilərində birillik və çox illik, əlaq otlarına, qarışı çox effektiv və geniş təsirə malikdir.

Təsiredici maddə: 700 qr/kg Metribuzin

Preparatın forması: İslanan toz

Toksikliyi: LD₅₀ oral 2000 mq/kg

İstifadə kateqoriyası: üçüncü

Ekotoksikliyi: Tövsiyə olunan normada fitotoksik deyildir. Su mənbələrinə, anbarların və kanalizasiyaların preparatla çirkəndirilməsinə yol verilməməlidir.

Rizestentliyi: (davamlılığı) müəyyən olunmayıb.

Karantin müddəti: 30 gün

Qarışması: İstehsalçı firmanın tövsiyəsinə əsasən preparat bir çox pestisidlə qarışdırıla bilər. Ancaq məsləhət bilinir ki, əvvəlcədən məhlulun qarışmasını və qarışığın bitkiyə təsiri test edilsin.

Təsiredici maddə: 700 q/kg Metribuzin

Preparatın istifadə rəqləməti:

Bitki	Məsərif norması kg/ha	Əlaq otları	Çiləmənin aparılma vaxtı və metodu
Kartof	1,0 – 1,8	Birillik birbirləpəli və ikiləpəli əlaq otları	Çıxış olmasından əvvəl torpaq çiləməlidir
Kartof	0,6 – 0,8	Birillik birbirləpəli və ikiləpəli əlaq otları	Çiləmə kartof bitkisi 5 sm olan mərhələdə
Pomidor	0,7 – 1,2	Birillik birbirləpəli və ikiləpəli əlaq otları	Şitillər əkiləmədən əvvəl çiləmə aparılmalıdır
Soya	0,8 – 1,2	Birillik birbirləpəli və ikiləpəli əlaq otları	Çıxışdan əvvəl torpaq çiləməlidir

Təsir etmə sürəti:

Çiləmədən 2-7 gün sonra təsir simptomları görünür, 10-15 gündən sonra işe əlaq otu məhv olur. Maksimal tez təsir etmə erkən çiləmələrdən və uyğun şəraitin olmasından (optimal temperatur və nəmlik) aslıdır.

Təsir etmə müddəti: Bütün vegetasiya ərzində təsir göstərir. Preparat kök və yarpaq sistemi vasitəsi ilə sorulur. Həssas əlaqlara çiləmə ərzində herbisidlik təsirini göstərir.

İşçi məhlulun hazırlanması: İşçi məhlulunu çiləmə ərəfəsində hazırlanması məsləhət bilinir. Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur sonra ora tələb olunan miqdarda preparat əlavə olunur. Çəndəki məhlul qarışdırıla - qarışdırıla qalan suda çənə əlavə olunur.

İstehsalçı:

INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL BENITO JUÁREZ MEXICO C.P. 03310

İdخالçı:

EMA MMC-Şirkəti
Şəhər şosesi, Sabunçu
370034 Bakı, Azərbaycan
+99411 450 34 17



Xa – zərərli
R – fraza: R22, R36/37/38
S – fraza: S2; S13; S201/21 S26; S46

1kg

İstehsal tarixi: 17.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya:
N-İQC-17021988549-365

