

İstifadə Ediləcək Bitkilər Və İstifadə Dozaları

BITKİLƏR	DOZLAR		İstifadə sahəsi	
	Torpaqdan və damcıdan (Lt / da)	Yarpaqdan	Torpaqdan və damcıdan	Yarpaqdan
Açıq Tarla Tərəvzələri (Fomidor, bibər, badımcın, lobya, bibər, noxud və s.)	1-2 lt	100-200 cc /100 lt su	Əkin etmədən əvvəl yere qoyulur. Biki inkişaf dövründə suvarma suyu ilə verilir.	Bitkilər 10-15 sm boyaya çatdıqda, 100 lt su ilə qarşdırılır və bitkilərə pülverizə edilir.
Tarla Bitkiləri (Pambaq, qarğıdalı, soya, lütün, günəbaxan, yer fındığı, dənli bitkilər və s.)	1-2 lt	100-200 cc /100 lt su	Torpaq əkməyə hazırlandıqdan sonra kifayət qədər su ilə qarşdırılır və torpağa verilir. Biki inkişaf dövründə suvarma suyu ilə verilir.	Əkindən sonra sonra 100 lt su ilə qarşdırılır və yarpaqlara pülverizə edilir. Yarpaq gübraları və əlaq otarı dərmanları ilə pülverizə edilə bilər.
Meyvə Bağları (Yumşaq və daş meyvə ağacı, sitrus, üzüm bağı, zeytun, fındıq, banan və s.)	1,5 -2 lt	100-200 cc /100 lt su	Torpağa vegetativ inkişafın başlanğıcında verilir, biki inkişaf dövründə suvarma suyu ilə verilir.	Torpaqdan hazırlanan təbiiqərdən sonra 100 lt su ilə qarşdırılır və yarpaqlara pülverizə edilir.
Qovun, qarpız, xiyar, balqabaq və s.	1 – 1,5 lt	100-200 cc /100 lt su	Əkin etmədən əvvəl yere qoyulur. Biki inkişaf dövründə suvarma suyu ilə verilir.	Əkindən sonra bitkilər 10-15 sm boyaya çatdıqda və ya salıqlamada başlandıqda, 100 lt su ilə qarşdırılır və yarpaqlara pülverizə edilir.
Şəkar çuğunduru, kartof, kök, V. Ş	1-2 lt	100-200 cc /da	İk təbiiq 4-6 yarpaq dövründə, ikinci təbiiq çapadın sonra və hasatda 45 gün əvvəl keçirilir.	Birinci təbiiq 4-6 yarpaq dövründə, ikinci təbiiq çuğunduru ara vermədən bağlanır.
bəzək bitkiləri	1-3 lt	100-200 cc /100 lt su	Yazdan etibarən 30 gün fasilələrlə təbiiq tövsiyə edilir.	Bitkilərin normal inkişaf dövründə 100 lt suya qarşdırılaraq yarpaqlara pülverizə edilir.
Tərəvəz və çiçək fidanlarında suvarma	1000-2000 cc/ dönümə (1000 m²)		100 lt su da qarşdırıldıqdan sonra fidan yastıqlıqları suvarılır. Dərhal arxasından təmiz su ilə təbiiq ediləcək köklərə emması təmin edilir.	

Hazırlanması və Təbiiq Şəklil:

İstifadə etmədən əvvəl qablaşdırma da yaxşıca çalxalayın. Təbiiq alətinin anbarı yarıya qədər su ilə doldurulur. Əvvəlcə təkli edilən dozada CONNECT, sonra əgər istifadə ediləcəksə yarpaq gübrası və əkinçilik dərmanı əlavə edilərək, tank su ilə tamamlanır və qarşdırılır və püskürtülür. pestisidlər yarpaq gübraları və biki böyüməsi tənzimləyiciləri ilə qarşdırılır bilər. On sınaq edilməsi tövsiyə edilir.

uniBa
TARIM SANAYİ TİCARƏT A.Ş.

İstehsalçı Firma
UNIBA Tarım San. və Tic. A.Ş.
AOSB 3.Kışım Mah. 30.Cad. No:29
Döğemealtı/ANTALYA/TÜRKİYE
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88
www.uniba.com.tr/ info@uniba.com.tr

Connect

SL

Leonardite maye hümkik turşusu

uniBa
TARIM SANAYİ TİCARƏT A.Ş.

Zəmanətli məzmun

(%w/w)

Üzvi Maddə	10
Ümumi(Hümkik+Fulvik) Turşu	12
Suda həll olunan kalium oksidi (K2O)	3.5
pH	10-12

Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında sarın və quru şəraitdə (minimum -0°C -dən + 40°C-ye qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq həddindən kənarda dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşıyır.

Xəbərdarlıqlar:
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.
UŞAQLARDAN VƏ QIDALARDAN UZAQ TUTUN.
DƏRİ VƏ GÖZ TƏMASINDAN QAÇININ.
YANLIQ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
TOPRAQ VƏ / VƏYA YAPRAQ ANALİZİ EDİLƏN GÜBRƏ İSTİFADƏ ETMƏK TÖVSIYƏ OLUNUR



Xalis çəki: 1 lt /1.1 Kq



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

EMA MMC
Sabuncu qəsəbəsi, şəhər çöşəsi
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Tel: (+994 12) 450 34 17
www.emagro.com